Dr. Szalay László

MÉHDOKTOR

Hunga-Print Nyomdai és Kiadó
Budapest, 1992

A méhek és a perzsák előkelő halottaikat viaszba, mézbe mártva, temették el.

A gyógyítás indiai rendszerében (Ayurveda, Unanti) többféle mézet ismertek és sokféle mézes gyógyszert használtak. Ha a mézet kősóval együtt csappentették a fülbe - csillapította a fájdalmat, a gyulladást és grógyhotra a sütkestjdet. Az indiai hagyományok alapján tudjuk ma is, hogy a lótusz-méz hatásos ellenszere a szembajoknak, enyhíti a sorvadást, javasolt fürdőkúrára, köhögésre, meghűlésre, szőrkékedésre.

Hagymalével együtt a szembe csepegtetve elmulasztja a hályogot és a farkasvakságot.

Ezerfelé és sóval kiegészítve és vízzel hígítva jó a vesezett kutya harapása ellen.

Ha az állapotos nő korán reggel fogyasztott mézet, az szorító fájdalmat okoz, ami a terhesség megszűnéséhez vezet.

A méz egyéb ismert tulajdonságai: könnyen emészthető, ízletes, étvágyserkentő, erősítő, üdítő, mikrobaellenes, köhögéscsillapító, megerőltető a foghúst, a fogakat; használható sárgaság, lép-magyagyebedosis, mellkasi-bántalmaknál, nemi gyengeség, vese- és epekő, bélfogók, mérgezések, daganatok, szív-betegségek és lepra ellen.

2500 évvel ezelőtt a görögök és főnikiaiak Afrika partvidékein méhészkedtek, s a méhészeti termékekkel virágzó kereskedelmet folytattak.

Az ókori Hellas-ban előkelő látogatót megvendégelése után mézzel nem volt elképzelhető. Ismerték a fagyasztóvilla a mézből készült szeszes italokat. A halottak szájába mézeskalácsot tettek. A rómiaiak mulsum, mellitites és aquarmulsa néven fogyasztottak összlegesleteiken a mézből készült szeszes italokat.

Plíniusz említést tesz mozgatható szerkezetű méhlakásokról is. 2100 évvel ezelőtt a mai Franciaország és Britannia területén élő lakosság számos tulonyiéhan használt a hátra mélhetetű tevékenységüknek.

Különféle bibliai szövegekben is szerepel a méz. Sifamono mondta egykor fgayed flaiti a mézet, mertjó, és a számnéz édes a te torkodban. Második részletre: Ha mézet találsz, egyél annyit, amennyi elegendő a számodra, hogy ne talj túl jól és kiköpjed.

A MÉZ

percig kis lángon. Ekkor kész, forrón gondosan át kell szűrni és üvegpalackokba kapszulázni.

Javallat: szívsorvadásnál, szív- és gyomorkörnyéki puffadásnál, vizességnél.

Uborkalé és méz az akné gyógyítására: 1 evőkanállnyi apróttt uborkát leöntünk 2 dl forró vízzel, állni hagyjuk, majd leszűrjük és 1 kávéskanál mézet adunk hozzá. A lébe ámbrott vattapamacsokat 30-40 percig tartsuk az aknésbrón.

Sebor rheiskbgyulladásra javasolt kezelés: Szájtyalvekelet kell egy pohár hideg vízben állatni (kb. 30-40 percig) majd utána szűrjük le. Ehhez az oldathoz 1 kávéskanálnyi mézet kell adni. Naponta 2-3-szor pakolást tesznek a beteg bőrfelületre.

Ugyanígy lehet kórhmvinjogos(Calendula) mézet készíteni.

Népi gyógyászati javallata égési sebek, felkfjedt és piszkos gyógyítására: 10 pohár (normo pohár) vízben állatni, 30-40 percig forralni, egy evőkanál mézet, csomagoljuk a pépet gézbe és készítsünk arcpakolást.

A tőlgyikéreglevonat mézzel, és a mézes-hagymás pakolás bőrgyógyászati készítmények. Érdekes a köhögésre javasolt mézes receptkivonat. Kvájk reteknye mézet tettek, és addig tartották a kútjegesedett retket. A retek-mézkivonatból minden étkezésekkel 1-1 kávéskanállal fogyasztottak.

Bélrenyhesége mez és tők volt a gyógyszer. Vénás érgörcsre, aggkori szívelégtelenségre mézes fokhagymát ajánlottak.

ben, mert ebben a formában nincs szükség ismételt hőkezelésre, ez a méz nem folyik le a kemyérről, vastagabban kenhető és ezáltal is több mért fogy.

A lépesmézet a méhfogyasztás legtermészetesebb formája.

Figyelemre méltó az NSZK-ban, 1987-ben, általános és belgyógyász orvosokkal készített közvéleménykutatás eredménye. A megkérdezettek a kenyér fenntartására alkalmas hétféle termék közül egészségügyi szempontból a mézet tették az első helyre 93%-os arányban (második lett a sajt, harmadik a gyümölcsök).

Arra a kérdésre, hogy szokott-e javasolni betegeinek a méz fogyasztását a felmérésben szereplő orvosok 8,9%-a felelt igennel.

Hogyan gyógyít a méz

A méz gyógyászati alkalmazási lehetősége közül néhány:

A méz fontos terepeutikus hatása antibiális tulajdonságában rejlik. Ez a képesség az egyes fajtákban más és más.

Gyümölcny-mézekkel végzett kísérletek is bizonyították, hogy a különböző mézek eltérő mikrobaellenes tulajdonságokkal rendelkeznek. A termőhely, a tárolás, annak időmérséklete ugyancsak hatással van a fertőtlenítő képességre.

A méz legismertebb tápláló és gyógyító hatása az erősítés. A méz főleg monoszacharidokból áll, amelyek azonnal felszívódhatnak, rögtön a vérárumba kerülhetnek.

A kimerülést gyorsan, hatékonyan meg lehet szüntetni mézzel. Sőt sokszor is hosszantartó szív- és garatgyulladásnál naponta egy kanál mézet ajánlunk, amit sokáig kell a szájban tartani. A sűrű, főleg kristályos méz mandulagyulladásnál baktériumölő, gennyeltávolító és gyulladáscsökkentő hatású.

A gyomorban a méz stabilizálja a savháztartást. A méz segíti az emésztést. Enyhe hashajtó hatása különösen az élőfoglalkozásúak és az idős emberek számára kedvező.

A máj ellátása egyszerű cukrokkal erősíti szervezetünk lagnagobb mirigyét, ezáltal elősegíti tevékenységét, például a mérgtelenítést. így felbecsülhetetlen jelentősége van például gomba- mérgezés, általás utáni mérgetlenítés és egyéb mérgezések esetében.

A szervezet saját mérgei ellen is hatékonyan védekezhetünk mézzel. A terhesség vészes hányás káros következményei ellen is jó a méz, mert azt az anya csak riitkán hányja ki, de ha uz mégis megtörténne, akkor a mézoldatot bedörzsölés formájában is be lehet a testbe juttatni.

Ugyancsak hasznos a méz a krónikus fémmérgezések (ólom, kadmium), és arzén, a vérhas, többféle tífusz és sárgaságnemű betegségek gyógyításánál, mint kiegészítő anyag.

Egy müncheni orvos a méz hashajtó, mérgtelenítő hatását a sárgaság gyógyításánál tudta hasznosítani.

Az intenzív kórházi kezelések hatására terjedő vírusos hepatitis gyógyszeres kezelését érdemes kiegészíteni mézzel.

A méz nem csak enyhíti, hanem a vesére, a hólgyhólyagra és a hasnyálmirigyre is kedvező, védő hatást gyakorol. Ez lehetővé teszi, hogy a cukorbetegek az engedélyezett szénhidrátrbevitel határain belül mézet fogyasszanak és ezáltal olyan anyagokhoz jussanak, amit másból nem kaphatnának meg.

A mézet a természetes gyógymódokat alkalmazó klinikákon a következő esetekben alkalmazzák: keringési zavarlási szívelátási zavarok, szívritmuszavarok, szívizomgyulladások, infekciós betegségek utáni károsodások, infarktusok, hipertónia és pótkezelés gyógyításnál alkalmazása után.

Egyiptomban a mézet terhesség okozta maga s vérnyomás és ödéma kezelésére is sikeresen alkalmazták.

Japánban a mézet több mint 2500 éve használják gyógyításra és most már belekerült a Japán Gyógyszerkönyv-be. Japán orvosok állítják, hogy a méz elsimerten javallat bizosít az emésztési betegségek, bőrbetegségek esetében, javítja a légzőszervet, a keringési szerveket, idegeket, érrékszervelet, fogakat, az anyagcserét stb.

Bolgár orvosok is elismerik a méz baktériumellenes, nyálkaoldó, érzéstelenítő, gyulladáselfenes, bioloógiailag immunizáló, regeneratív, szívserkentő, nyugtató, idegerősítő hatását, de úgy tartják, hogy ezen tulajdonságok csakkor érvényesülnek a gyomorszerkcíók hatására, ezért nem csak szijon át, hanem aerosol és elektroforézis útján vitják be a szükséges mézmentiséget. Edelig 15 000 páciensnél kezelték a légzőrendszer betegségeit (cormyálkahártya gyulladás, torokgyulladás, ormvélkiéreg-gyulladás, gégehurut, légcsőhurut, hörghurut) úgy, hogy a páciensek 92 %-ban visszanyerték egészségüket.

Magyar tapasztalatok a méz gyógyhatásáról

Magyarországon a régi népi gyógyászatban a mézet különféleg és behőleg is alkalmazsak. Az orvosi irodalomban is sokan írtak a méz gyógyhatásáru.

Az intenzív kórházi kezelések hatására terjedő vírusos hepatitis gyógyszeres kezelését érdemes kiegészíteni mézzel.

A méz nem csak enyhíti, hanem a vesére, a hólgyhólyagra és a hasnyálmirigyre is kedvező, védő hatást gyakorol. Ez lehetővé teszi, hogy a cukorbetegek az engedélyezett szénhidrátbevitel határain belül mézet fogyasszanak és ezáltal olyan anyagokhoz jussanak, amit másból nem kaphatnának meg.

A mézet a természetes gyógymódokat alkalmazó klinikákon a következő esetekben alkalmazzák: keringési zavarlási szívelátási zavarok, szívritmuszavarok, szívizomgyulladások, infekciós betegségek utáni károsodások, infarktusok, hipertónia és pótkezelés gyógyításnál alkalmazása után.

Egyiptomban a mézet terhesség okozta maga s vérnyomás és ödéma kezelésére is sikeresen alkalmazták.

Japánban a mézet több mint 2500 éve használják gyógyításra és most már belekerült a Japán Gyógyszerkönyv-be. Japán orvosok állítják, hogy a méz elsimerten javallat bizosít az emésztési betegségek, bőrbetegségek esetében, javítja a légzőszervet, a keringési szerveket, idegeket, érrékszervelet, fogakat, az anyagcserét stb.

Bolgár orvosok is elismerik a méz baktériumellenes, nyálkaoldó, érzéstelenítő, gyulladáselfenes, bioloógiailag immunizáló, regeneratív, szívserkentő, nyugtató, idegerősítő hatását, de úgy tartják, hogy ezen tulajdonságok csakkor érvényesülnek a gyomorszerkcíók hatására, ezért nem csak szijon át, hanem aerosol és elektroforézis útján vitják be a szükséges mézmentiséget. Edelig 15 000 páciensnél kezelték a légzőrendszer betegségeit (cormyálkahártya gyulladás, torokgyulladás, ormvélkiéreg-gyulladás, gégehurut, légcsőhurut, hörghurut) úgy, hogy a páciensek 92 %-ban visszanyerték egészségüket.

ELŐSZÓ

Természetesen az ózgyógyítóshoz fokozott hozzáértés szükséges. A többnyire agresszív kemikáliák szabálytalan alkalmazása veszélyes doleg. Ugyanez az apiterápiai anyagok és készítmények esetében sokkal kevésbé kockázatos.

A növényi és a méhészeti bioaktív anyagok jelentős része lúsérője volt az emberiségnek a történelem folyamán.

Mindezek ellenére tanulnunk kell az apiterápiát, hogy figyelembe vehessük az egyéni reakcióképességet, különbségeket. Az emberre szabott gyógyítás nem fejezódhet ki általános sémákban. Csak a személyre szabott terápiák segítségével érhet el a beteg és gyógyító igazi eredményeket, gyógyulást.

A közjégkorban azt hitték, hogy a méh a mézben leghatásosabb, leggyógyítóbb növényeket hordja össze és ezért az alkimisták nagy mennyiségű mézet desztilláltak, hogy a növényi qusirt-eszenciát jét nyerjék ki belőle. A sűrítménynt aranyfilaszt elegyítették. Ez volt az Aurum potabile (=ihető arany), mely állítólag még a halottakat is feléleszette.

Edmund Heiold pap., méhész írta, hogy egy korai keresztény legenda szerint a paradicsomból való kilzetéskor a méh különleges kegyelemben részesült.

A középkori kolostorokban a méznek és a viaszmak is nagy szerepe volt. A méz Szent Hildegard (1098–1179) gyógyászatában is fontos szerephez jutott (pl. gesztenyeméz és a szőbor).

Magyar méhész előd e ink

Az ősmagyarok is ismerték a méhészkedést. A népvándorlás alatt is mindvégig volt kapcsolatuk a méhekkel. A letelepedés kezdetén a méhészkedésnek, mert voltak hagyományai és dús, változatos mélhegelő dlt a méhek számára. A méhészkedés az idők során többszörösen is rendkívüli jelentőségű. Néhány példa.

1564-ben a brassóiak *Sándor* moldvai fejedelemnek ajándékba mézet és méhészkedéssel kűldtek, ami nagyon megnyerte a fejedelem tetszését.

1619-ben *Borsos Tamás* Konstantinápolyból *Bethlen Gáborhoz* írott levelében azt kéri, hogy minél több magyar mézeskalácsot küldjön és minél gyakrabban, mert ijben apró ajándékokkal tartja fenn a török pasákkal a barátságot.

1686. január 20-án *Weber* német császári hadbiztos a körösker-től 200, a kecskeréttelcél 200 oka mézet rekvirált és rá 10 napra Mehmed Tihája budai pasa a körösiekről 1000, a kecskeméticiek-től 2000 oka mézet parancsolt Buda-ra szállítatni. Ebben az időben a kecskeméty fogyasztóval az ára a pesti pauson 1 icce méz volt.

1707-ben *Rákóczi Ferenc* 109 itce mézet követelt Kassától és a szomszédos községektől.

A méz kűkristályosodását az emberek azóta ismerik, amióta a méhet. A keresztes-virágúak (pl. a repce) méze még a sejtekben is gyorsan kristályosodik vűlik. Ezt a jelenséget Gálli Imre (1941) szakíró így magyarázza: "A kristályosodást a mézben előforduló szőlőcukor okozza. A szőlőcukor ugyanis vízben rosszabbul oldódik, mint a gyümölcscukor, s ha a méz vízben szegény, vagy kevés a gyümölcscukortartalma, úgy a szőlőcukor oldatban tartására a folyékonyság nyaga a mézben nem elegendő."

Még kell még jegyeznünk, hogy a gyümölcscukor édesítő képessége két-szer akkora, mint a szőlőcukoré, ugyanakkor a gyümölcscukor, frukte felszívődása a belben kétszer olyan lassú, mint a glükózé. A gyümölcscukor, amint áthalad a bélfalon, nagyrészt átalakul a szőlőcukorrá.

A természetes eredetű nádcukor (szacharóz) aránya a virágmézekben maximum 5 %, édesharmat, akác és levendulamézben viszont 7- 10 % feltt.

A nektár nem tartalmaz fehérjét. A méz nitrogén vegyületei főleg virágpor tartalmából származnak. A kimutatott 18 fűle aminosav közül a prolin a legjelentősebb.

Az enzimek, fermentumok a méh gaustmirigy-vüládkalélet kelnek a mézbe. A szőlőt hatékony anyag közül a legnevezetesebb a glükózoxidáz, amely a glükózt glükózsavra és hidrogénperoxidra bontja. A glükózsavat hozzájárul a méz savtasságához, a hidrogénperoxid viszont a méz antibiális hatásának legfőbb biztosítéka.

A méz vitaminokban szegény anyag. Előfordulói vitaminok mennyisége 100 grammonként:

C vitamin 1-4 mg
B1-vitamin 0,002–0,004 mg
B2-vitamin 0,02–0,1 mg
nikotinamid 0,1–0,2 mg

Egres mézekben zsírsavak is kimutathatók. Ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű a gesztenyeméz, amely éppen ezért alkalmas vérkeringési betegségek, trombózis, artritisz, nőgyógyászati betegségek és fertőzések gyógyítására.

A szőszdfordulón a mézmek a táplálkozásban betöltött szerepe még jóval nagyobb volt, mint mostanában. Akkor a cukor volt a drágább. A falvaiban sokkal többen méhészkedtek. Gyakran csak annyi cukrot vásároltak, hogy a télük nyerhető-mez a határtalis szükségletet is kielégítse. így is takarékoskodni kellett ezzel a csalánnem egyetlen édesítőszerrel. A táplálkozási kultúra legszőbsabb elemei az ünnepi ételek, ezért a méz korábbi jelentőségét is az ünnepi ételek őrzik - állapítja meg dr. Kotics József néprajztudós. Például a pünkösdi-bun még a legszebb ünnepi ételek közé is elmaradhatatlan része volt a karácsonyi bejti vacsorának a makos guba. Ugyancsak mézzel készítették a makos csíknak nevezett bejti ételdt is.

A mézes-mák-os kukorica főképpen a lányok csemegéje volt a Lucca-napi (december 13.) hagyományos táncos összejöveteleken, de a fonóban is kukoricafánkot ősszoltak is. *

A mézes pálinka készítéséről Regily Antal nyelvtudós (1857) is megemlékezik. Eszerint a mézet serpenyőben felolvasztották, majd utután kihűlt, pálinkát öntöttek rá, amelt a tűzre tettek és összemelegítettek. Ezt az édes italt főlig az asszonyok fogyasztották lakodalmakban.

A mézes bor és a mézes pálinka a disznóroast, a csigatészta-készítés alkalmával kialakult gyülekezetek kedvenc itala volt. Általános szokás volt, hogy a gyermekágyas asszonynak mézes pálinkát vittek ajándékba.

Az egykor hires mészört a következőképpen készítették: a sonkolya viaszt ömlesték, majd a tűzhelyen vagy a kemencepadkán melegítették. A folyadék forrása közben kefekocsó habot szedtek-mallal eltávolították. A leiszaltalt folyadékot fahordókba vagy üvegekbe öntették át és úgy nyújtották. Ezt két hét múlva, majd még négy alkalommal hetente átszűrték. Máshol, másképpen is készítették mészört, de az eljárások abban mind megegyeztek, hogy sonkolyos mezőtt indulnak ki, tiszta mézet sohasem iktdoztak erre a célra. A préselésel vagy melegítéssel kinyert mézet étdlészetükre vagy igen gyakran gyógyításra használták.

Mézbe vegyítsünk finomra tört ő mazkat-diót és finomra tört fahéjat, ebből a sűrűségnek megfelelő mennyiséget.

Méz rokoltség ellen:
2 tojássárgáját keverjünk össze 2 evőkanál mézzel. Öntsünk rá fél csészényi forró feketekávét, kavarjuk össze és dörzsöljük el forró, ahogy bírjuk, igyuk meg. Ezt naponta legalább háromszor ismételjük meg, egyúttal naponta többször egy-egy szeletke lépesmézet.

Légzőszervi megfázás és bronchialkatarrus ellen:
Legjobban bevált a kakukkfű (thymian) gyógycsepje mézzel való használata. Szamárhur használata is kitűnő, mivel a köhögési ingert csillapítja, gyöngíti csillapító és nyálkaoldó hatása miatt. Vegyünk kakukkfűfüvet, főzzünk meg egy csészére vizet, leszűrjük, teájuk-hoz bele egy evőkanál virág- vagy hársfavirágmézet és jó forrón igyuk meg. Naponkénti ismétlés után a köhögés megszűnik.

Köhögés ellen:
Vegyünk egy nagy fekeretetlet, tetejét vágjuk le, belsejét kalaribéfűrészkéllel szépen szedjük ki, mint ahogy a sütemények kanálnéval szokták. Ezt kis lábasba tegyük és olvasszuk meg. Ecsilter-mézet, pirtunk-mag vilásgosbarnára, vigyázni kell, hogy meg ne égjen, mert akkor keserű lesz. Öntsük azon forrón a nektárt, abban a pillanatban megszeesedik, kűdőb zombun levet ennek a mézes-nektárnak, ebből naponta 3-4 kanállal kell ölni. Ugyanez megtehetjük vastag sárgaréjvaal is. Ez a legjobb nyálkaoldó és köptető ége tőnyösen ellen, mint gyermekeknek.

Limonádé lézga hörgőbaj ellen:
Egy pohárba csavard 1 citromnak a levét, tégy 1 evőkanál mézet hozzá, kavard jól össze, öntsd tele a poharat hideg vízzel. Meghűlésre kitűnő hatású.

Tüdőcsúcshurut ellen:
Egy darab tormát, egy hazsarónagyökeret gyomlós adagban megreszelünk és annyi virágmézet öntünk rá, hogy összekvarhassuk belőle egy- Meleg helyre tesszük, hogy jól összeérjen, reggel ébgyomorra és este lefekvés előtt egy kanállal kell bevenni. Alí tűrelemmel használja meg aztkűrás nélkül, még a legmakacsabb idült bajnál is sikeres gyógyulást hoz.

Szemlé- és hörghurut ellen:

Az egész természetgyógyászat számára megszűrelenedő gondolat tok. A természetes hatóanyagokat tűladagolni nehezebb és kevésbé veszélyes, mint a szintetikus gyógyszereket, de nem kizárt és általmas is lehet. Valószínűleg mindannyian ismerjük olyan esetekből, amikor valamilyen eredeti mennyiség eltérésére történő csökkentés vagy növelő hatásnak mondott anyagot, szert, eljárást alsószóluzált és ad absurdum favorált, amíg a várt kedvező hatás elmaradt vagy kiesett.

Az időfényező hibás megítélése is gyakran ért természetgyógyászt hatásiránt. A kímélettes hatóanyagok érvényesülésehez általában hosszabb időre van szükség, használatuk hosz tűtervet, különtás szükséges.

Virnagy Miklósné is vallja: A gyermekeknél kűra alkalmával erős kűtartás és nagy türelem szükséges, olyan, mint amilyenre csak egy gyermeke egészségért rajongó szerető édesjó anya képes."

Vármegyénk az időszakra is gondolt: ilyenkor a gyógyszertárak ősze s ebből vagyon be a beteg óránként egy kávéskanállal."

A többnyire ismeretlen mézanyag készítésére tett javaslata: „A jó hatású mézszirup így készül: 1 liter vízzel 4 kiló méz melegen elkevertik. Ehhez 2 g cramm eucalyptus-eszencia, mely minden gyógyszertárban kapható, keverjük össze. A beteggel szemben 1 kanál mézet még átszott borics, narancslevél, hársfavirág vagy szeder levé adnak. Bronchitis-, tatha-, torokfájás ob. ellen alkalmazzák."

Mézfajták

Bizonyos, hogy a mézbogyaszókat az is érdekli, hogy az egyes mézfajtáknak milyen sajátos, jellegzetes tulajdonságaik vannak. Az alábbiakban részletesebben jellemzünk néhány jellegzetes mézfajtát.

Az akácmézt világos, sokáig folyékony, alácvirág illatú. Főleg kötőgés ellen javasolják. Mint a virág teája, az akácméz is ajánlott a gyomornal nélkülözhetetlen mitt bekövetkező emésztési zavarok ellen.

A hárfamézt sötétebb az akácnál. Erős illatú, idegnyugtató és antiszeptikus. Idegesség, nyugtalanság, álmatlanság leküzdésére javasolt. Jó hatást érnek el vele bronchitis és köhögés ellen. Szokták mézpakolásokat is készíteni belőle, ilyenkor a hámtermészet. Lázas megbetegedésekre hatásosabb, ha hársfateavval együtt fogyasztják.

A gesztenyemézt használható tromboflebitis, visszértágulat kezelésére. Jó a vérszegénység csökkentésére, kimerülésre, legyengült állapotban, étvágytalanság ellen.

Hagyma (pohinka-) mézt erősítőszer, csökogtó a bőrkiegedést, csökkenti a gyermekek enyhe asztmás tüneteit.

A levendulamézt: Franciaországban mindennapos, újabban nálunk is elfoglalt. Nyitott sebekre kívülről, de ajánljuk álmatlanságra, vesepanaszokra és fájdalmakra is alkalmas. A spanyol természetgyógyászok fő reghajnálként használják gyerekeknél.

A mézek többsége a méhnek gyűjtő viselkedésének megfelelően vegyes összetételű, ami egyúttalán nem hátrány, hiszen többféle növénytől származó nektár révén a méz hatástertülete is kiszélesedik.

A kifort mézsör virágillatú és igen zamatos (zl). Fogyasztását nagyon egészségesnek tartották. Nagy becsben tartották, csak jeles alkalmakkor és akos mértékkel fogyasztották. A megbecsülés jele volt az, ha valaki megkínálták vele.

Nemesseghy javaslatai

Nemesseghy Kálmán, méhész és cukrász, 1907 márciusában „Méz a háztartásban" című könyvecskéjében így foglalta össze véleményét: „Méz: a beteség orvosság; cseresemnőek és gyermeknek jó tápszer, a testnek a fejlődését gyarapítja és szellemi erejét emeli; öregnek és gyenge gyomorúaknak könnyen emészthető és kitűnő eledel; végre a méz az emberi életnek a fenntartásához kellik, mert abban van balzsamos zsiradék, fehérje, növényi kivonatok stb., ami tápláló és erőt ad, benne különböző savak varnak, melyek az ideges és beves vérű emberre csillapítólag hatnak."

Számegyeum receptje közül válogatva, olvasóink ismeretek, amelyek jelegzetesek vagy számunkra is hasznosak lehetnek.

Diétételek:
30 deka finomra őrölt dió, fél citrom reszelt héja, meleg mézből annyi, hogy sűrű, keverhető massza legyen a keverékből.

Mákétkelet:
egy edénybe tesszünk 30 deka finomra őrölt mákot, fél citrom leresztt héját, 3 gramm finomra őrölt fahéjat, 3 gramm finomra őrölt szegfűszeget, majd pedig meleg mézből annyit, amiből a keverék a tésztán könnyen kenhető lesz.

Ezeket a tőtételeket kell használni pozsonyi dió- és mákos-patkóhoz és még sok más esetben is.

Gyermek-kétszersült:
15 deka finom* liszt, 4 deka élesztő és 2 deciliter tejből kovászt készítünk. Ha megkelt, összegyúrjuk egy tojással, 15 deka mézt, 15 deka méz, 12 deka vaj, 5 gramm só, 5 tojássárgájából, hozzáadva a kovászt és a szükséges mennyiségű lisztet, hogy tészta legyen belőle.

Kitűnő gyógyhatása miatt nem győzőm elégé dicsérni, mert amiben egyszerű, olyan csodahatású. Gyermekek a legszívesebben bevszik. Nagy jó fokhagymát megtisztítunk, táblácskán teljesen szétjjel zúzzuk, bögrébe tesszük és annyi mézet öntünk rá, hogy könnyen összekevarható legyen. Folytonos kavargatás mellett szép világos barna megpirítjuk, napjában többször adjunk belőle egy-egy jó kiskanálnyit.

Légzőszervi megfázás ellen:
Legjobban bevált a kakukkfű (thymian) gyógycsepje mézzel való használata. Szamárhur használata is kitűnő, mivel a köhögési ingert csillapító, gyöngíti csillapító és nyálkaoldó hatása miatt. Vegyünk kakukkfűfüvet, főzzünk meg egy csészére vizet, leszűrjük, teájuk-hoz bele egy evőkanál virág- vagy hársfavirágmézet és jó forrón igyuk meg. Naponkénti ismétlés után a köhögés megszűnik.

Köhögés ellen:
Vegyünk egy nagy fekeretetlet, tetejét vágjuk le, belsejét kalaribéfűrészkéllel szépen szedjük ki, mint ahogy a sütemények kanálnéval szokták. Ezt a kis lábasba tegyük és olvasszuk meg. Ecsilter-mézet, pirtunk-mag világosbarnára, vigyázni kell, hogy meg ne égjen, mert akkor keserű lesz. Öntsük azon forrón a nektárt, abban a pillanatban megszeesedik, kűdőb zombun levet ennek a mézes-nektárnak, ebből naponta 3-4 kanállal kell ölni. Ugyanezt megtehetjük vastag sárgaréjvaal is. Ez a legjobb nyálkaoldó és köptető ége tőnyösen ellen, mint gyermekeknek.

Limonádé lézga hörgőbaj ellen:
Egy pohárba csavard 1 citromnak a levét, tégy 1 evőkanál mézet hozzá, kavard jól össze, öntsd tele a poharat hideg vízzel. Meghűlésre kitűnő hatású.

Tüdőcsúcshurut ellen:
Egy darab tormát, egy hazsarónagyökeret gyomlós adagban megreszeljünk és annyi virágmézet öntünk rá, hogy összekvarhassuk belőle egy- Meleg helyre tesszük, hogy jól összeérjen, reggel éhgyomorra és este lefekvés előtt egy kanállal kell bevenni. Alí türelemmel használja meg aztkűrás nélkül, még a legmakacsabb idült bajnál is sikeres gyógyulást hoz.

Szemlé- és hörghurut ellen:

Mű már egészségesebben, nyersen tudjuk megőrizni a gyümölcsök értékes anyagait, de ne feljtsük el, hogy a mai eredmények a múlt igyekezetén alapulnak.

Figyelemre méltó, amit a régi méhész-cukrász a fagylaltról ír „Gyümölcsfagylaltnak csakor helyett akác vagy más világos és gyenge ízű mézet használjunk. Tejes vagy tojásnes fagylaltnoz mézet használni nem alkalmas, mert az fűtés közben összefut. Így az anyag elveszhetetlenné válnak."

Gyümölcsteák készítéséhez mennyiségű mézre van szükség a gyümölcs fajtája szerint. Sárgabarackhoz 1:1 arányban szükséges mézet és gyümölcs, szamócával egy rés egynegyed, meggy és cseresznye esetében 50 dkg, ugyancsak ennyi kell a földidoda-tojhoz, a birsalmakocsonyához, de már 60 dkg mézet szükséges a ribiszke- és málnakocsonyához, de már 60 dkg mézet szükséges a ribiszke- és málnakocsonyához, 1-1 kg-ja után.

A gyümölcsekből és mézekkülcs készítése, nemcsak régi időkben is hasznosak tartom. Bárki készíthet mézeskalácsot Nemesseghy *Kálmán* (1909) receptje szerint:

50 deka lisztet, 42 deka főzött mézet, fűhéj- és cseppfűszerek, 6 gramm finom porrá tört hamuzsót, 6 gramm finom porrá tört szalkárét, 1 tojást és 1 tojássárgáját gyúrunk. A tésztánkat a borjelletgit, amit pedig nemrég vettünk meg, lisztezett deszkán 4-5 deka lisztet, 15 deka méz, 12 deka vaj, 5 gramm só, 5 tojássárgájából, hozzáadva a kovászt és a szükséges mennyiségű lisztet, hogy tészta legyen belőle.

—Legjobb tulajdonsága, mely utolérhetetlenné teszi: az állandósága. Ugyanezt olykor a czukros készítményekről, mely pedig sokkal több belső ellenszerrel tartósítható, mint a méz, nem lehet elmondani. Ha pudnik, omlósak lesznek, fölmelegítés által pedig, ki úgy szeretí, ismét roppogósakká tehetők és hónapokon át eltarthatók."

Feltétlenül megegyezünk abban, hogy a méz tesz állandóan szépvé az arcbőrt? Nem a kozmetikai szerek használata, de a rendes bélműködés, és azt a hász mézes tésztákkal tökéletesen el lehet érni."

Vegyis: étolaf az orvosságod elvét fogalmazza meg. Alapjában igaza van. Sajnos abban az időben a magyar nép egyoldalúan szlad fogyasztott cerealíákból. Ország egészségi-ről jelentett, ha a tésztafőzőket ismert és használt vaiuki.

Kremniczkyné néhány jellegzetes receptje:

Égőzsíg ellen:
Fél kilogramm mézhez hárfavirágból tisztított, két deciliter mélegített méz, két főhert tojás, kávés tört fahéj és reszelt narancshéj (ehet egy kanál czukrot is beletennij, egy késhegyni szódabikarbónát szórjunk bele, és annyi lisztet adjunk hozzá, hogy sűrű, de azért tömöttet vastagságra kinyújtani, csillag vagy más alakúkat kimetszeni, lisztbe hintett bádogra rakva, fölvert tojással megkenve, forró sütőben kisütni.

Purim torta
56 dekagramm mézet kissé megmelegítünk, de darab tojást fölverve hozzáverünk, két kiskanál szódát is lisztet, amennyit fölvesz. Ezeket együttjól el kell keverni. Egy szűk fölmaradt mandulát, ugyanennyi diót és mogyorót vékonyra vagdalva beletermi, keskeny bádogot megkenve beleönteni. Ha kilonőtörik nem szabad boltajtót, egyenlő tüzelés mellett lassan sütni.

Gőzölölt csók
Egy fehérjéhez lisztet (ehet másfélt is), fél liter forró *mézet* egy tálban jól elkeverve 24 órán át pihenni hagyjuk. Másnap gyógyán megmelegítve gőzölölhető. Teszczik, s tésztánk hozzá még négy tojássárgáját, fél czitrom héját, két késhegyni szódát egy kanál szalicylt papír közt megtörve, kevés fahéjat törve. Jól elősgozzuk, kis ródnyi darabkákat kézt hőt megformerve, egy fél szem mandu-

na-mézzel ugyanez az értek 5,5%. A mézzel szembem a légérzékenyebb mikroorganizmus a Bacillus steaanothermophylus, a légellenállóbb a. Escherichia coli evél. Az Apis leghatásosabb mézei Mimosa és Eucalyptus nektartból, a Trigona legaktívabb mézei Borreris és Mimosa szerkezetből származtak.

Érdekes felismerésen jutott a kalocsai főiskolai tanárok a közlönbső mézmintákban a szaprofita gombák és élesztőfajok szaporítőképességének előidézésével. Sok mintdent találtak a mézben, de az addig nem befolyásolta a minőségét, amíg eredeti állapotában maradt. Baj, káros elváltozás csak akkor következett be, ha vélettenül vagy tudatosan felhígították a mézet.

Spanyol szakácskönyv (1941) figyelmeztet mélító-megállapítást a méz egészségügyi értékéről: „Igaz, hogy egy-két kilogramm méz ellegyasztása nem sokat ér, mert csak úgy van meg a hatása, ha naponta 12-15 deká-t fogyasztunk."

„Antán jó a méz retekhez, almával, dióval és mogyoróval. Vajas kenyérre mézet kenni szintén kitűnő."

Fogyasszuk tehát mézet, mert mézzel mélító-megállapítást a méz egészségügyi értékéről: „Igaz, hogy egy-két kilogramm méz ellegyasztása nem sokat ér, mert csak úgy van meg a hatása, ha naponta 12-15 deká-t fogyasztunk."

„Antán jó a méz retekhez, almával, dióval és mogyoróval. Vajas kenyérre mézet kenni szintén kitűnő."

A többnyire ismeretlen mézanyag készítésére tett javaslata: „A jó hatású mézszirup így készül: 1 liter vízzel 4 kiló méz melegen elkevertik. Ehhez 2 g cramm eucalyptus-eszencia, mely minden gyógyszertárban kapható, keverjük össze. A beteggel szemben 1 kanál mézet még átszott borics, narancslevél, hársfavirág vagy szeder levé adnak. Bronchitis-, tatha-, torokfájás ob. ellen alkalmazzák."

A VIRÁGPOR

A virágporról joggal mondhatjuk el szuperlatívuseknak, ami a nyerstost kivételével minden tartalmaz, ami az életez szükséges.

Sajnálattal el kell ismerni, hogy a virágpor még hamar elveszti hatóanyagait, ezért ajánlatos, hogy friss tavaszi nyerstost.

A virágpor nemtékonyabb ígéretes gyógyszer a könnyen emészthető anyagok közé tartozik, ami nem kíván a méhektől.

Gálli Imre (1941) szerint: „A sejtekbe rakott virágpor elromlását a méhek azzal akadályozzák meg, hogy a sejtekben a virágport vízz

Metionin	0,42	0,39	0,80	1,8	2,1
Fenilalanin	0,66	0,69	1,43	3,9	4,2
Treonin	0,38	0,67	1,38	4,0	2,0
Triptofan	0,20	0,20	0,34	1,3	0,5
Valin	0,91	0,90	2,0	5,7	3,0

A kimutatásból leolvasható, hogy 100 g vitéznyár (aminosav szempontjából) egyenértékű 0,3 kg marhahúsnak vagy 7 db tojásnak, márcsak 30 g (2 csapott teáskanállal) pollen fedezi egy felnőtt ember egész napi fehérjeszükségletét.

Lengyel kutatók úgy találták, hogy a vitéznyár pollenjét tartalmazó készítmények, mint a búzacsíra, az aminosav-összetétele hasonló volt a szójáéhoz, de a metionin tartalom kétszeresen meghaladta a szójáét.

Az allergiának is feltétjenagyok, amelyek szénhidrátokat és szénanyagokat is tartalmaznak. A szélmegporzású növények (gabonafélék) virágpora idézi elő leggyakrabban a szénanáthát, ezenkívül még a „vadkender" és a bodzapollen lehet veszélyes, de ezeket a mézek nem tartalmazzák.

A vitéznyár lipidtartalma életlanúag sokkal jelentősebb a részaránynál. A lipidek között találhatók viaszok, gyantúk, terpének, illóolajok, fitosztierinek stb.

Telítetlen zsírsavak a linolén-, a linol- és az olajsav.

Flavanoidok: kaempszetrin, kolosztrin, a rutin, a mellékhatásterin stb. A vitéznyárok színét karotinoidok és flavonoidok adják.

A vitéznyár a vitaminokban leggazdagabb méhészeti termék. Magas a pollen B-, C-vitamin, rutin, fisher és biotin tartalma is. Ezenkívül sok más vitamin és provitamin is megtalálható a virágporokban.

A virágporok tartalmazzák a hormonokat (gonadotrópin és növényi növekedést szabályozó hormon) és enzimeket is.

A pollen gazdag ásványi anyagokban. Röntge-n-fluoreszcens analízis módszerével 20 elemet mutattak ki a virágporból. Makroelemek közül feltüntetendő a K, Ca, P, S, Cl, Mg. Nyomelemek közül megemlítendők: Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, Cr, Ni, Si. Ezelen kívül olyhor egyéb mikroelemek is előfordulnak. A mennyiségi eltérések az elemek összetételében a növények fajtájától és származási helyétől függenek. Az is mindenképpen igaz, hogy a virágpor nitrumtelesleg és kálium hiány esetén előnyös pótápláléh.

A virágpor előnyei

A méhek gyűjtötte virágpor nagyon ajánlatos serdülő, növekedő gyerekek számára. A kraikkó Állami Gyermekotthonban tapasztalták, hogy a méhpollen játékony változást hozott a gyermekek

Milyen az igazi virágpor?

A fogyasztók nagy része a sárga színű virágport favorizálja, sőt megegyőzőlése, hogy csak a sárga az igazi. Ez tartalmatlan szlatobramalizmus.

Igaz, hogy sok virágpor sárga (mogyoró, borostyán, baltacím; erdeifa, japánakác, pohánka, bárs, gesztenye, sáfl eh.), de gyakori a fehér (kukukkfű, pitypang, kislevelű hárs), van lila (bókoló bogánycs, zilaz, varfű), kék (tücsfilu), sárgásvörös (kárdvirág), sárgásbarna (szivarfű), vörösbarna (bokréta), zöldeszürke (szamárbogánics), sötétszürke (pipacs).

A szín azért sem mérvadó,-mert a virágpor más színű fénsen, mint kiszáradva. Pl. a naparafogyasztók fényében is narancssárgának, szürazon sötétebb sárga; a levendulapollen szárazon vörösessárga, egyébként fakósárgás, a kályósnyar virágpora szárazon kékes, egyébként fakósárgás stb.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy észtegetésen túlságosan magas hőmérsékleten szárítottak.

A virágpor színe mellett más értékmérő tulajdonságait is figyelmébe kellene venni. Még az egyformán sárga virágporok sem egyenlő értékűek.

A méhek részben a virágpor fajsúlya és valószínűleg protein-tartalma alapján értékelik a különböző növények pollenjét.

Sorrend fajsúly alapján: napraforgó 1,37
mogyoró 1,01
lucfenyő 0,55
kukorica 0,35

Lehetséges, hogy emiatt nem gyűjtik a méhek a tök virágpontit (fajsúlya: 0,21).

Sorrend a protintartalom alapján:

jók	(%)	közepesek	(%)	gyengék	(%)
pipacs	2,37	fehér akác	1,47	napraforgó	0,23
feskenfű	2,17	alma	1,65	sütőtök	0,18
nagytevélű hárs	2,22	gyermekláncfű	1,73		
vadrózsa	2,25	uborka	1,54		
mogyoró	2,28	dália (dúpe)	1,46		
fehér fűz	2,80	lucerna	1,33		

sőlnek emészthető anyagai. Az ásványi anyagokat a **biokémiai** változások kevésbé érintik.

A virágporban igen magas lehet a vastartalom, központos **mértékű** a cink és a mangán jelenléte, alacsony a réz és a **nikkel aránya.** Alacsony arányban előfordult még a méhkenyér-fajtákban **a kadmium**, kobalt, króm és az ólom is (1 ppm alatt).

A fehérjetartalmat a méhkenyér érési folyamatában **résztvevő** mikroorganizmusok tevékenysége befolyásolja, az ásványianyagtartalmat viszont elsősorban a talaj tulajdonságai határozzák meg.

A méhkenyér ugyanolyan régi méhtermék akárcsak a méz. Az emberek egyidőben és egyszerre fogyasztották méhkenyérrel. **Amikor** még az ember a mézbeszerzés mellett a méhészkedésre használta az állatot? fosztott méhsalád egész lépkészletét pergetés nélkül, **mindenestül** elfogyasztotta, akár ez máik méhnyerés is ewett.

Varró írásaiból tudjuk, hogy az ókori rómaiak már ismerték a méhkenyeret. Akkor is lényegesen drágább volt és többre is becsülték a méznél. Erikse-nek nevezték.

A méhkenyér értékadó tényezői közül az ízfogásúgt azzal lehet **magyarázni,** hogyjóval kevesebbet készítenek belőle a méhek, mint pi. **a méhből,** másrészt kinyerni is nehezebben lehet. Pergetéskor kevésbén is a sejtekben marad. Kézi eszközökkel a méhkenyér nyolcféle **munkaidőben** legfeljebb egy kilogramm méhkenyeret tud kinyerni.

A méhkenyér előnyei

A sejtekből kipiszkált méhkenyérből naponta elég fél **teáskanálnyi.** Legegyszerűbb, ha a méhkenyeres mezőt kivágjuk a lépből és egy falatnyi darabot addig rágunk, ameddig csak a viasz **marad a** szájunkban. A viaszt kiköpjük, nagy akár le is nyelhetjük, **nem árt,** nem lesz belőle baj, emésztetlenül kiválaszzuk.'

Gyógyszerlálag a méhkenyérnek nagyjából azonos az **inflikátja,** mint a virágpornak. Az új lehetőségek kísérleteszélhez laborállatokat használnak.

hatékony á terhességi mérgezésre. Vagyis nem alkalmas akut szimptómák esetén.

E. Spudich (1981) előadása szerint Romániában méhpempő-oldattal kezelnek a felső légutak krónikus bántalmai ellen betegeket. A torok-spray-t naponta qyssor, összesen 10-sze alkalmazzák. A vizsgálatok a torok fájdalmainak csökkenését, á váladékok kevésbedését, a légutak jobb átjárhatóságát (könnyebb légzés) állapították meg. A kezelés után a páciensek szai voltak a hangúnkak, ami nagyon fontos a színészek, énekesek, ta nárok számára.

A sok helyen többek által folytatott kutatások eredményeként kialakult az a terület (indikáció), ahol a méhpempő hatásos apiterápiái szer lehet. A leggyakrabb alkalmazási területek: agat szklerózis, más öregkori jelenségek, alultáplálttság, szövetbántalmos megbetegedések, emésztési zavarok, mongolizmus, avitaminózis, mirigyzavarok, bőrbetegségek stb. Hosszabb időn át nagy mennyiségben méhpempőt fogyasztani nem ajánlatos.

Amíg a méhek szárításának hatásosságát mindenki tisztában volt, addig a mérgy mibenléte is sokáig nem ismeretes. *Balogh Bálint* még 1915-ben így írt: „De nemcsak fegyverként használják a fullánkot, hanem a már teljesen bebrett méz romlásának megakadályozása czéljából a sejt belsőjébe előtt egy kis hangyasavat eresztenek abba a fullánk segélyével."

Lassanként kiderült, hogy a méhmérgy nem hangyasav. *László Márton* "Gyakorlati méhészet" című munkáját dátum nélkül adta ki, ilyen megjegyzéssel: „Készült a szabadságharc 100-ik évfordulóján", vagyis 1048-ban. A már nem hízni, hogy a méhek hangyasavat termelnek. Ezt írta: „A méhmérgy szaga észlé hasonló a hangyasavhoz. A régiek valószínűleg ez a körülmény ejtette tévedésbe és ezért nevezték el azt hangyasavnak. Sőt, ezt a mérget a legtöbb méhész még ma is hangyasavnak nevezi. Bizonyítékul *Dr. Longer* volt csehországi orvos és *Flury*, a würzburgi pharmacologiai intézet igazgatója egybenegyszer megállapították, hogy ez a méhmérgy alkotóelemeiben nem is hasonló a hangyasavhoz, hanem inkább a kígyómérgez, leginkább a viperamérgéhez áll közelebb, de ettől is különbözö, qétszer különleges antiszeptikum, amelynek a tapasztalat szerint a sérteten polen eredeti nyíllásain át is értékesítsük annak gazdag delkezésére.

MÉHMÉREG

Bulgár kutatók a méhkenyérnek az ódémás gyulladásos folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálva azt tapasztalták, hogy apiterápiái ezen a területen is sajtbejárónak.

Kínai tudósok kobaltial besugárzott gerekeken fügyelték a méhkenyér hatását.

A méhkenyér jelentősségét rendkívül megemelte az a felfedezés, amit bulgár kutatónők tettek 1980-ban. Ők különítették el a méhkenyérből az adoligén nevű anyagot, amely gyulladáscsökkentő hatású.

A méhkenyér szélesebbkörű apiterápiái felhasználását, ritka volta és az emiatt megfelelően drágasága akadályozza. Ezt a helyzetet meg tudnánk változtani a biotechnika segítségével.

MÉHMÉREG

Angyalkőnöng a méhekkel kapcsolatban azonnal a mézre gondol, de közreltemíl utána arra, hogy szúrnak. Ezt az érzést fejezi ki Csokonai Vitéz Mihály Keserédes című versében.

„Ha mézet dá is a méh,
Fullánkja nékta megesáp."

Amíg a méhek szúrásának hatásosságát mindenki tisztában volt, addig a mérgy mibenléte is sokáig nem ismeretes. *Balogh Bálint* még 1915-ben így írt: „De nemcsak fegyverként használják a fullánkot, hanem a már teljesen bebrett méz romlásának megakadályozása czéljából a sejt belsőjébe előtt egy kis hangyasavat eresztenek abba a fullánk segélyével."

Lassanként kiderült, hogy a méhmérgy nem hangyasav. *László Márton* "Gyakorlati méhészet" című munkáját dátum nélkül adta ki, ilyen megjegyzéssel: „Készült a szabadságharc 100-ik évfordulóján", vagyis 1048-ban. A már nem hízni, hogy a méhek hangyasavat termelnek. Ezt írta: „A méhmérgy szaga észlé hasonló a hangyasavhoz. A régiek valószínűleg ez a körülmény ejtette tévedésbe és ezért nevezték el azt hangyasavnak. Sőt, ezt a mérget a legtöbb méhész még ma is hangyasavnak nevezi. Bizonyítékul *Dr. Longer* volt csehországi orvos és *Flury*, a würzburgi pharmacologiai intézet igazgatója egybenegyszer megállapították, hogy ez a méhmérgy alkotóelemeiben nem is hasonló a hangyasavhoz, hanem inkább a kígyómérgez, leginkább a viperamérgéhez áll közelebb, de ettől is különbözö, qétszer különleges antiszeptikum, amelynek a tapasztalat szerint a sérteten polen eredeti nyíllásain át is értékesítsük annak gazdag delkezésére.

Készítmények

A virágpor lehetséges allergiázálást elkerülendő egyes országokban olyan készítményeket hoztak forgalomba, amelyből ígyet ilyen kiváltják az allergen vegyületeket. Belgrádban (a Méhészeti Kombinát és az Egyetem) dolgoztak ki a Kombipol-HG és a Kombipol-H.L nevű készítményeket, amelyek vesely ebből a szempontból kiküszöbölhetők az élelmiszer, a gyógyszerészeti és a kozmetikai iparban.

A Szovjetunióban zsíros és vizes pollenkivonatokat ismertek.

Legújabb, legagyszerűbb lenne a friss mélygyűjtőtte virágpor. Puha, léltes és így a legtermészetesebb, a leghatásosabb. Ilyesmihez főleg a méhész és családja jut. A nagyközönség számított, szemcsés virágporhoz jutnak a kereskedelmen. Ha kímélletesen szárították, akkor kevesel veszít értékéből és keménységét is meg lehet szakni. Van aki szárazonn összezúzja, majd valamilyen ínalul leöbtöl. Ali ezt nem bátja, az fogyasztás előtt teljen feloldja. Gyerekeket mézzel lecsitett tejbe tett virágporral lehet részoktatni.

A natúr virágpor is szabályozza az emésztési tevékenységet. Egyaránt hatásos a hasmenés és a szélkezelés ellen. Kedvező emésztési zavarok és hurutok esetében.

A pollen javítja az étvágyat, elősegíti a jobb tápanyaghasznosítást és javítja a szellemi képességeket.

Svájban „Apidlor" pollenpreparátumot használnak étvágytalanság, alultáplálttság, általános gyengeség, a lementési fáradtság ellen. Sólyos időben Ausztriában is ezt használják a lementési fáradtság ellen. Svájcban a kimerültség tünetei ellen is ezt ajánlják.

Kínai kutatók ezt a tényt makiókkal (Rhesus) etetett repcepollennel kapcsolatban tudományos igényű kísérletet igazoltak: az ozmózis-nyomás változásáig, az emésztőcsenmek hatására a szárított pólus felhígult, a béltartalom hozzáférhetővé válik.-

MÉHKENYÉR

A méhkenyeret viszonylag kevesen ismerik, ezért röviden be kell mutatnunk. A méhkenyér a virágpor módosult formája.

A méhkenyeret (bee bread) olykor „méhkapátbólvaló pollen", néha „lépollen" néven említik. Ezek a kifejezések jelzik, hogy a méhek gyűjtötte virágport a pollencsapda ellenére, vagy annak hiján a kaptár belsejébe került.

Id. Boczonádi Szabó Imre 1913-ban így írt a méhkenyérről: „A készítbe helyezett virágpor, vagyis a méhkenyér 18% felnyét és emellett több mint 25% csiloffélét tartalmaz, tehát táplálóbb ajó búzakenyérnél.

A méh a legfőbb tápanyagot a lépek sejtjeibe tömködik, ahol a rovar-enzimek hatására megindul az összetett cukrok hasítása, ugyanakkor elkezdődik a tejsavtermelő baktériumok és az élesztőgombák szaporodása. Csökken az anyagban a pH-érték, savasabb lesz a sejtartalom. Később az élesztőgombák a tejsav egy részét felhasználják, de a méhkenyér íze, illata így is savanyúvá marad.

A felmérés mutatott természetesen a béltartalomnak is módosító hatása. Lengyel kutatók 1985-ben 23 méhlepet és 11 virágpor mintát vizsgáltva úgy találták, az albumin-tartalom a méhkenyérben átlag 24,37 %, a pollenben 28,0 % volt. A méhkenyérben a glutén részaránya 5,49 % volt, a prolin-é 4,36 %, ugyanez a virágpornál 5,2, illetve 6,12 volt. Az egyes méhkenyér-minták az albumin-tartalomban igen nagy különbségeket mutattak volt a szórásdn.

Ha a méhkenyérben kevesebb is a nitrogén-tartalmú anyag, mégis ételnek tápláló, mert a virágporná jóllakom, a könnyebben értékesíthető állapotba jutott.

Vegyes anyagok

A kaptárban, a lépekben vegyesen vagy közeli szomszédságban együtt találhatók az apiterápiában használható anyagok. Az emberiség az egyötlés előfordulás természetes formájában egyszerre fogyasztotta a lépek minden anyagát. A méhészkedés fejlődése során a lépek minden egyre tökéletesebb elkülönítését, ma viszont ismét nem mindegy, hogy a méhészet az egyes összetevőket komplex anyagokat javasolja a hatások növelése, a hatáskeresztezés kedvelésének érdekében.

Gyakran összekeverjük a virágport és a mézet. Ez mindkét termék javára válik. A méz vitaminokkal dúsul, a virágpor pedig tovább megőrzi értékes anyagait. A virágpor érzékeny a szárításra. A mézes virágport kevésbé szükséges légszárításra szárítanunk. A méz elzárja a virágporról a levegőt, oxmózis útján elvonja a maradék nedvességet, vagyis hathatósan konzerválja.

Az éwgbe töltött virágporra annyi folyékony mézet töltünk, amennyit már éppen nem tud beszívni. Ebből a sűrű masszából elég naponta 1 kávéskanálnyi az egészség, az aktív életnyi.

hogy az alapanyagok tisztak és friss lepek legyenek és akkor a remélt hatás bizonyára bekövetkezik.

A méhpempő egyes esetekben allergiás reakciókat is okozhat, ezért különösen óvatosnak kell lennünk az ilyen betegségek esetében. Az ultrapasztőrözött tej csak a fiziki szempontokat veszi figyelembe, szőmikrobiológiailag is esetleg nem tiszta. Ezért a tejet hanyatt vakmilva-vonal különböző bőrápoló szereket, samponi és hajápolót jelent.

Apilomil és Apirollmpy román lizenc alapján csak Romániában gyártanak, de a hereálica anyagaiban kínálkozó lehetőségét más országok kutatói is elismerik és megkísérlik hatásukat, az apiterápiás szolgáltatóba állítani.

A pro-polisz = város előtt, ógörög eredetű szó. Metaforikusan értjük jelentését, elsőt, amelyik vélt a mögötte területet, a második nagy a mélységét, a harmadikat. Tar a gyakorlat már az egy szerepére is utal: megakadályozza a fertőző betegségek bejutását.

Igen szubsztanciára nagy szüksége van a népes méhcsaládnak. Hiszen a világon olyan nagy testűek, amelyikben annyi állat volna együtt, mint amennyi egyed van egy népes méhcsaládban, s mégis rítkábbak a járványok. A propolisz testi hangyik valamiféle mjrálod tiszteségük agyának. A szőrös méhek csak a fiókái szeretgetésétől tudnak megszabadulni tisztálkodásuk során, a káros mikroorganizmusok ellen csak propoliszállással védekeznek.

A propolisz mi mit nemzetközi fogalom. Minden nyelvben is mert, emellett vannak a fogalomra sajátos nemzeti szavak is. Például magyarul még méhszurokuak is nevezik; az angolok bee glue, a németek Kitharz néven is említik.

A propolisz fogalmát így határozzák meg: „A méhszurok vagy propolisz a méhek többnyire vagy ragasztóanyag, melyet növények mézgás anyagaiból, rügyek ragadós váladékából gyűjtenek össze. Ezt az anyagot a kaptár repedéseinek betapasztására, a feldúlt egyenlétségek, idegen maradványok bevonására használja. A fiatalos használt bálnegyes sejtéket is vékonyan bevonja propoliszszal, mert a méhanya különben nem petézne bele. Az összegyűjtött méhszurok viszet és egyéb idegen anyagot is tartalmazhat.*

MÉHVISZ

A viasz nélkülözhetetlen a méhek számára. Viaszból épült sejtekben fejlődnek ki a családok utódnépesek, sejtekben tárolják a mézet és a méhkenyeret. A méhek, mondhatni, viaszárosban élnek.

A méhviasz az ember is felhasználja a saját céljaira.

A méhviasz szine halványsárga (gyakran sötétebb), íze enyhén édes-édes, jellegzetes szagú. Szobahőmérsékleten szilárdan törik, a kézemelgetett meglágyulva gyúrható.

A méhviasz elégué drága, ezért előfordul, hogy olcsó adalékanyagokkal növelik a tömegét, ezért tudunk kelt a hamisítottan termelt főbb jellemzőit.

A valódi méhviasz rágáskor nem tapad a fogra; a megyárt viaszhoz nem lehet szálat húzni (ha fagyó van benne, igen); a vékonylap átlátszó, de nem átlátszó (ha igen, parafinnal keverték); ha valódi méhviasz fölkelten vékony csíkot húzunk egy keményfán, majd a kaparás nem hagy fényes nyomot; olvasztott viaszcsepp az ujjunkra pottyintva nem oldoz kézfelett zsíros folttá (ha igen, mesterséges szénhidrogén hozzáesnyeezett).

A tiszta méhviasz olvadáspontja 62–65 °C. Az etilől a hőmérséklettől lényegesen eltérő olvadáspont hamisítást sejt.

Kémiailag a méhviasz zsíravasknak alkoholtál történt elésterezése. Tartalmaz még propolisztot, szennyeződéseket. A faggyúgeryza, a gyantás nyomokat

A propolisz tulajdonságai

A propolisz szine általában sárgásbarna, márványozott. A különböző fajtákon rügyeinről származó propolisz-rakományok eltérő színű-

MÉHVISZ

Érdekességként megemlítem, hogy *George Bush,* az USA elnöke, ugyancsak érzékeny a méhmérgre. Balkezes, műrpedig ők gyakrabban alkalmazzák általában és a méhmérgre is azok.

A méhmérgy alkalmazása kockázatos, nagy hozzáértést, az egyéni tulajdonságok figyelembevételét igényli (különösen áll ez a megállapítás a méh-alkapunktúra igénybevételére).

A szív ritmuszavarai ellen alkalmazhatunk még rövidhatlámot, infravörös és ultraibolya besugárzást, ultrahangkezelést, ionophoresis-t. Ezeknek a nem toxikus eljárásoknak a kombinálása apiterápiával adóg nem is remélt talált sikelt, eredményt ad.

Az embereket nagyon érdekli, hogy miként lehet védekezni a méhszúrás ellen, hogyan lehet a várható fájdalmat és feldagadást elkerülni? Számtalan javaslat született már. Például *dr. Szivérdi Ferenc* (1949) javasolta: „A szúrás helyét, ha hozzáférnék, szívjuk ki és kenjünk be ottott mézzel vagy szalmikasszonzel." Másból: „A szúrás helyét szokták megnedvesített háziszappannal bekenni vagy szódás oldattal."

Valószínű, hogy minden dózsolós hozzájárul a mérgek szétterjedéséhez, felhígulásához, helyi hatásának csökkentéséhez. A könyvben elérhető anyagok közül a méhészeknek rendszerint rendelkezésükre áll a legtöbb szer: a propolisz.

A valódi méhviasz rágáskor nem tapad a fogra; a megyárt viaszhoz nem lehet szálat húzni (ha fagyó van benne, igen); a vékonylap átlátszó, de nem átlátszó (ha igen, parafinnal keverték); ha valódi méhviasz fölkelten vékony csíkot húzunk egy keményfán, majd a kaparás nem hagy fényes nyomot; olvasztott viaszcsepp az ujjunkra pottyintva nem oldoz kézfelett zsíros folttá (ha igen, mesterséges szénhidrogén hozzáesnyeezett).

A tiszta méhviasz olvadáspontja 62–65 °C. Az etilől a hőmérséklettől lényegesen eltérő olvadáspont hamisítást sejt.

Kémiailag a méhviasz zsíravasknak alkoholtál történt elésterezése. Tartalmaz még propolisztot, szennyeződéseket. A faggyúgeryza, a gyantás nyomokat

Kaptárlevegő

A kaptár belvilága meglehetősen állandó fizikai tulajdonságokkal rendelkezik. Hőmérséklete és páratartalma csaknem független a

A sugártérápiában részesülő betegek egy idő után elveszítették az étvágyukat, szokszor hánytak, súlyos rosszullétre panaszkodtak. Nálluk a szokásos gyógyszeres támogatás nem használt. *Dr. Feiczki,* kísérletképpen, 17 időskorú sugárbeteget kapcsolt be a kezelésbe. Ezeknek napcsalit adott 3 héten keresztül. Ennek hatására a sugárbetegség szimptómái mindeniknél elültnek. Később *Feiky* doktor 37 nőt mint a sugárkezelés előtt ellátott Medveasa-val. Ezek közül időved, csak egynél léptek fel a sugárbetegség tünetei.

A besugárzott rákos betegeknél mellékhatásként rendszeresen jelentkezik a súlyvesztés. Az *Ivo Medveasi* csoportnak 70, 3 kg-nak mutatkozott a kontroli-csoport 1,2 kg-jával szemben.

Indonéziai orvosok (Dzsakartai Egyetemi Sebészeti Klinika) megismerkedve az időskori emésztőszervi betegségek kínálatával 640 rákos beteget (52 nőt és 8 férfit) a betegség különböző stádiumában: besugárzottak, operáltak, operálhatatlanok, reményteleneek. Naponta három alkalommal 10 kapszulát (ez is pollen mézhempő kevesk). A bőnapos kezelés a következő eredményekkel járt: a Medveasi-kezelésben részesülők nem fogtak, sőt 0,6 kg-ot hízlak, a páciensek 70%-a szubjektive jobban érezte magát. A betegek 90%-ának javult az étvágya, míg 10%-uk mindvégig étvágytalan maradt. A legsúlyosabb esetek), a belmilkózis 70%-ánál javult, normalizálódott. A kezelt 60%-a közölte, hogy jobban alszik (az rákos betegeknél jellemző tünet).

A *Hungal* a rosszindulatú daganatok ellen önmagában támadja meg, hanem a szervezet támogatásával, az immunrendszer serkentésével éri el a tapasztalt eredményeket.

A pollen-méhpempő preparátumokról megállapíthatjuk, hogy azok rendkívüli mértékletelről, regenerálő és roborálő hatással rendelkeznek, szemben a rönngésárgaszirtad és a citoszztatikumokkal, melyek mennyiseka a rákos, de az egészséges szervezetet, nökvekedését is gátolják és sok kellemetlen mellékhatást idéznek elő.

Megjegyzem kívánom, hogy a pollen-méhpempő preparátumnak nem kell feltétlenül gyári készítménynek lennie. Kellő körültekintéssel rendelkező méhészek és több természetgyógyász is képes hatásos apiterápiás preparátumot készíteni. Elsősorban arra kell ügyelni,

A PROPOLISZ TULAJDONSÁGAI

A propolisz származása

A propolisz erezdete sokáig vitatott volt. Az ókorban *Plinius* és *Dioszkoridesz* vitatkoztak, de az sem tudták megállapítani a pollenből a méhek. *Plinius* szerint a propolisz a fűz, a nyár és a vadgesztenye rügyeiről származik, míg *Dioszkoridesz* szerint a propolisz erezdete a bemelfelkkedő ércnek) borostyán és gyantás növényeiből.

Mintegy kétszer év múlva még mindig dúlt a vita a propolisz származását illetően. *Dr. Kitzenmacher* 1907-ben adta közre elméletét, mely szerint a méhek a virágporból nyerik a propoliszt. A bélcsatorna sajátságos szakaszokban a „chylus Magen"-ben a pollen ellőgyanúsítva után megkí, vízfelvétel után felpuhúad, béltartalmát a méhek a fiaskák táplálására használják, míg a propolisz a virágporszemcsék bőjából képződik. A kísérlett propoliszot a méhek különféle szemétfelt és viaszmaradékok, amíg úgy beszűrődnék, hogy szétbontása és felhasználása lehetővé nem vállt.

Tisztázódott a propolisz alkotórészeinek növényi eredete, egyúttal gyanúsítva a fenyőkérgek szerepét is. Kiderült, hogy a kérgek a növényi dolgozók rágójukkal összegyűjtött anyagaiból a melegről megpuhult balzsamot a rügyek felszínéről, lábaikkal a hátsó láb kosárkájabujtatják, majd a ka pártársaik tervezik, amíg úgy beszűrődnék, hogy szétbontása és felhasználása lehetővé nem vállt.

Tisztázódott a propolisz alkotórészeinek növényi eredete, egyúttal gyanúsítva a fenyőkérgek szerepét is. Kiderült, hogy a kérgek a növényi dolgozók rágójukkal összegyűjtött anyagaiból a melegről megpuhult balzsamot a rügyek felszínéről, lábaikkal a hátsó láb kosárkájabujtatják, majd a ka pártársaik tervezik, amíg úgy beszűrődnék, hogy szétbontása és felhasználása lehetővé nem vállt.

ek (tölgy és gesztenye piros, nyár barna, fűz sárga stb.), azok a raktározás helyén egymástól összeomlásra és így adódik a makrónyos tarkaság.

A propolisz szaga ámbrához hasonló, balzsamos. Csaknem azonos a balzsamos nyírfarügyével illatával. A kaptárnak, a méhészházak jellegzetes illatú levegőjét főképpen a propoliszrnak köszönhetjük.

A propolisz fajsúlya: 1,033–1,145. A hőtől és a fénytől, fel és le-ruhától, szélvihár egy fénél és egy állati ízző rétegre. A mindig jelenlévő méhviasz kivédik és a felszínre emelkedik.

A propolisz olvadáspontja 81-83 °C. Hidegen ridog, kagylósan törik, melegen nyúlósan nagyadás.

A propolisz kémhatása savanyú: pH = 3,5–4.

Ha nem tudnánk a propolisz sokirányú kívánt felhasználását, akkor kellemetlen, a méhész munkáját akadályozó anyagnak tekintenénk. Sokáig így is volt. A méhészek nehezen tudták megjósztani a propolisz kaptárt és annak részeiben, amiről kellett. (Hanemann-rácsi helgetők), a kaptárban mozgását egészen eldöntik, aztán vigyáztak, hogy bele ne lépjenek.

Normális viszonyok közt a méhész fokozott mértékben gyűjteni a propoliszt, azután gondosan kinyeri és hasznosítja kivá lónyagait.

…*.

fűlapokat, és némelyik évben még októberben is gyűjthetnek propoliszt.

A propolisz alkalmazásának történelmi áttekintése

A propolisz gyógyhatását az emberiség a legrégibb idők óta ismerte. Okkal feltételezhető, hogy a neolit-korszakban propoliszszal láttuk el a sebeit. A propolisz elősegítette a koponyalékeletek életbenmaradását.

Az ógörögök ismerte a propoliszt. A "fák könyvének" tartotta, ami elsősorban a fűzfára és a szállóra vonatkozott. *Virró, Plinius* és *Dioskoridesz* valamennyien azt írták, hogy a propolisz már régóta használatos. *Varro* tudta, hogy a nektárt, a varjúport és a propoliszt a méhek nem ugyanazokról a növényekről gyűjtik. Többek között így írt: „Propolisznak nevezik azt az anyagot, amelyből ők (t. i. a méhek) a nyár közepén a méhkaptárban a szelet védelmet építenek. Ezt az anyagot az orvosok ugyanazon a helyen kenőcsként használják, ezért drágábbi, mint a Via Sacra-ban kapható méz."

Plinius háromféle propoliszt használó anyagot különböztet meg, s mindháromfajtát orvosi gyógyszernek minősítette. Tudta, hogy ezek az anyagok kenőcsként csökkentik a fájdalmat. Használta a begyulladt tőkék eltávolításánál.

Dioskoridesz megírta, hogy a propolisz sárga és illatos, puha és ragadós. Kenőcse megszünteti a sömört, gége jó a köhögés ellen. A méhsarok nyílásánál találhatód és a viaszhoz hasonló természete van."

Abu Ali Ibn Sina (Avicenna) „Az orvostudomány kánonja" című híres munkájában tiszta és fekete viaszról ír. Szerinte: „A tiszta viasz alkotója a lépek falát, amiben a fiatalokat felnevelik és amiben a mézet tartják, míg a hőkben is megmarad a méz. Utóbbi lehet a propolisz. Nyilhegyek és tűskék sebből való eltávolításánál javasolja. Megjegyzi: „A fekete viasz átható szaga tüsszentésre készteti az embert".

Z. A. Makavii közli, hogy már az V. században számos gyár orvosi munkában gyakran javasolják a propoliszt. Pl. Tritivii beteg

A meleg (50–60 °C-os) vazelinhez adott, majd együtt (70–80 °C-on 8-10 percig főzött propolisz-kenőcsöt Magyarországon is készítenek. Eredményesen használják fekélyesedő és égési sebekre.

A propolisz felhasználási formái

A propolisz értékét nagy mértékben befolyásolják a termőhelyek eltérő fizikai tulajdonságai, a növények különbözősége, a begyűjtés és a tárolás körülményei, valamint a tisztításával járó ráhatások.

Vauthier (Svájc) a propolisz nyers, eredeti formában való alkalmazását javasolja azzal érvelve, hogy az illóolajok nincsenek magukban foglalt, amit csak tartalmazhat a propolisz. A javaslat hibája, hogy nem veszi figyelembe:

1. A nyál és a gyomornyar nem szabadít fel minden igényelt hatóanyagot,

2. a nyers propolisz ismeretlen összetétele miatt távolról sem lehet meghatározni adagolni a használandó mennyiséget.

Az igényes felhasználás megkívánja a szinvonalas feldolgozást. A legyakoribb feldolgozási módszer az oldat-készítés.

Különféle legkülönfélébb nemű folyadékban juttathatód a kezelendő felületre. Legegyszerűbben légpumpás szóróflakonból lehet a nagyobb felületről és érzékeny testekre juttatni a propoliszt.

G. G. Kocini (Szovjetunió) propoliszos kenőcsöt ajánl fel gennyes folyását gyógyította. Naponta tampont helyezett a beteg üllő hallójáratába. A fülnyílás 10-15 nap múlva zárva maradt. Az orvos fülgégi gyógászatban – különösen – külföldön használják a propoliszos kiválóan. *Baidan* és munkatársai Romániában 1971 óta használják a 2-5%-os propoliszos kenőcsöt sebgyógyításra és kőelhárítva-gyulladásnál, járványos szaru-kötőhártyagyulladás ellen, a szemhéj ekcémájánál stb.

A propoliszkivonatokat használják gargalizálásra és aeroszolos irrigálásra is. A csehszlovák *Matel* a szájüreg és a gége betegségeit 3-5%-os alkoholos propolisz-oldatos aeroszolos inhalió segítségével gyógyította (8–12–szer egymás után naponta vagy másnaponként.

hígítsánál figyelembe kell vernii a kezelendő felület érzékenységét. A fluonoid-komplexum polivalens alkóija fokytán számos bántalomnál alkalmazhatód: reumatikus fájdalmak megszüntetésére, ekcémák, bőrgombásodások, szőrtüszőgyulladás ellen, vérzéscsillapítás, sebferdítésére, bőrregeneráláshoz stb. Lágy propoliszból bármikor készíthetünk *belsőleg is kenhetőt is. Hőnk, sőtt helyen tárolva hatását két évig megtartja.*

Propolisz kenőcsök

A kenőcs lágy-propolisz és semleges zsírszerű anyagok keverése. Alhigítás á felhasználó és annak testfelülete szerint változó. Hígítósalkalmazásodnak a felsudotokor, pl. egy kisbaba ekzémájához 2-3%-nyi lágy-propoliszt keverhetünk bőgyúgyász javaolta kétrnécz. Felnőttek gerincfájdalmainak csillapítására vazelinbe 10%-nyi lágypropoliszt keverünk.. Ezt a kenőcsöt állandó érzékenység esetén másnaponként este használjuk. Bedörzsöljük az érzékeny felületet és környékét, puha ronggyal letakarjuk és átkötjük (hogy ő ne mozdulj-jon a takaró). Időnként jelentkező fájdalmak esetén azonnal, de ha lehet, a rohamot megelőzően kenjük fel a kevertet.

A reumatikus fájdalmak ellen már a 10-12%-os kenőcs is hatásos. Összömörre (hosszabb időn át) 12–15%-os, látgombkötőcsra (néhány napig a 25-40%-os, égési felületre (azonnal használva) az 50-75%-os kenőcsöt alkalmazzuk. A kézen lévő fertőzéseket özülka, tünke, mérges pattanás) akár hígítatlan lágy propoliszsal is be • lehet kenni.

A frissen gyűjtött propoliszban még jelentős mennyiségű flavonglikozárid található. Főleg kvercitrin, izokvercitrin, kvemérnitrin, robinin, rutin, szantorumtin.

Jelentőségben csaknem azonosak a flavonoidokkal a propolisz illóolajai: fenil-vinilétor, benzil-alkohol, gyapjkol-vinil-éter, benzil-benzoát, (3-szulemol, cikla-hexil-benzoát.

Kisebb mennyiségben előfordulnak, de fontos hatóanyagok még a következők:

Kalloncit: butein, koreopszin, *Dihidrokalkonok*: floretin, floritcin,

Ketőnvek: gyökkoritchin, epikatechin,

Vitaminok: B1, B2, B6, C, E, nikotinsavi,

Aminosavak.

Enzimek.

Cserzőanyagok.

Rezinok: gyantásszínek, pesanticinsidok, aszonok,

Aromás elemek: Ge, Ni, Mg, Al, Pt, Si, Va, Co, S, Si, Zn)

Az egyes hatóanyagcsoportokon belül még jelentősen gazdagodhat a lista, mert egyre többet ismerünk az anyagkutatás mai színvonalán, amelyet mert még nem minden vidék sajátos propoliszait vizsgáltuk kellő alapossággal.

A természetes főrokátorokat figyelembe vévw Magyarország különböző termőhelyeiről származó propoliszokat hasonlítottunk össze. Ezek már makroszkóposan is jellemzően eltérőek. Színük a világos sárgától a sötét vöröses-barnáig váltakozott. Általában a fényesebbről származó propoliszok sötétebb színűek, aromásabb illatúak és rugalmasabbak. A nyárfás területekről származó propoliszok aromája is szintén aromás illású. A legmagasabb flavonol-tartalom a nyárfás erdők környékéről származik. Az ártéri nyárfás-fűzfás ligetek közelében a propoliszokban szalicilsavat lehetett kimutatni, amiről eddig a szakirodalom nem tett említést. Hazai propoliszunkban kimutatható volt a ferula- és a kávésav is.

Az illóolajok mennyisége feoldíott koncetációt, mutatott a flavonid összetételtől. A fenyvesekből és az akácosokból származó propoliszok mutatták volt a legmagasabb az illóolajtartalom. GC-MS módszerrel végzett vizsgálatok szerint a nyárfásról származó propoliszokban fenilbenzoátot mutattunk ki. Az akácosokból, illetve a napraforgós vidékekről pl. Gödöllő-kasagi dombsági eudcemvel-t tud tuni kimutatni., ami a Compositae családjellemző szeszlo-terpén laktonja.

fogra propoliszból, kevés arzénből, cickafarkfehérből álló keveréket ajánlott olíva-olajjal és mézzel keverve.

Egy gallai szerzőkerszből (Sallhan-Sava Obeliani 1658-1729) encíklopédiájában ez olvasható: „A propolisz viaszhoz hasonló anyag, amit a méhhas fenekén találhatunk".

A görög népi gyógyászatban az ízszűlőtt kőldökére propoliszlapocskákat helyeztek, a gyerekjátékokat propolisszal kentek be.

Ukrajnában és Bazahiában is évszázadokkal ezelőtt ugyancsak használták a propoliszt gyógyításra. Ezt alkalmazták a vásári fogházőlő.

Olaszorszában Italiában és lakószobák részére való fiatólét készítettek propolisz felhasználásával.

A propolisz termeltetése, begyűjtése és tárolása

Fokozottabb propolisz termeltetéshez, mint már tudjuk, népes családokra, bőségesen virágzó növényzetre (pl. akácfa), valamint hatékony propolisz-gyűjtő eszközre van szükség. Utóbbiból már sokféle készült forgalomba.

Az általában elterjedt gyakorlat szerint a méhész egész évben folyamatosan termelteti a propoliszt, és azt egyszer, télen gyűjti ki. Igazán igényes propolisz termeltetéshéd a szitetet kétszer kell elvégeznie.

A frissen begyűjtött propoliszt hővös, sötét helyen kell kitenni. A felületi oxidáció miatt érdemes gömbölyíteni.

A propolisz szavatossági ideje

Mennyi ideig tartja meg hatékonyságát a propolisz? A nyers propolisz nem sokáig: saját magfagyéséből szerint. Egy csaknem vaskosra tozatlanul megmaradt az anyag baktériumokkal (baktericiő) hatása. Az apríttotság, a magasabb tárolási hőmérséklet és a napfény a hatástartam csökkenését okozza.

ként). A propoliszkivonatok hasonnal fordíthatók egészségünk használhatóságára is.

Ajánlják, hogy hónoldéba és tsiba cseppetesnék, cukorral és kenyérrel itassuk fel. Vannak, akik így fogyasztják, mint az orvosságot. Korszerű formában zsetatinkapszulában adagolják a tinktúrát, hogy elkerüljék az alkoholnak a szá nyálkahártyáján gyakorolt kedvezőtlen hatását, valamint egyrészt *averzációt* a propolisz távol tesznek.

Az általunkbővő méréseken beszűrtett propolisz kivonatot zsíros vízlányagokkal keverjük össze, balzsamot kapunk. Leggyakrabban használt lipidek: szezelin, lanolin, vaj, őszibarack-, kajszibarack-, napraforgó-, lenolaj, Unguentum (Hypopthae marmelos) -olaj, fenyőolaj, borókaolaj stb. A kenőcsök gyakoribb alkalmazási területei: égések, fagyások, arnyirr, dőlmirigy-gyulladás (prostatitis-gyulladás), ekcémák, idegi eredetű fájdalmak, bőrsérülések, bőr- és könnyebben bőkodás, visszérgyulladás, arthritiszek, reumatikus fájdalmak és egyéb bőbetegségek, de a kutatókat alaqtján tovább bővítheti a kör. A Szovjetunióban, Romániában és másutt propoliszkenőcsöket tétek alkalmazzák az égési sebekre, a bőrátültetésekre. Ez nem más, mint propoliszkrémekre áztatott géz. Sok előnye révén minden más megoldásnál hatékonyabb. *Matel* (Csehszlovákia) a hüvelyi propoliszcsős gézt (tampont) is alkalmazott 5-10%-os spray-k mellett orrbántalmak gyógyítására.

Speciális készítmény az 5-10%-os propoliszos bőrkenőcs. A kenőcsök hatékony anyagait kakaóvaja kevesre szilárd gyógyszerformák készítettők. *Oshin* (Szovjetunió) végbélkúpot alkalmazott idülő dülmirigygyulladás ellen. Belegei teljesen meggyógyultak vagy jelentősen javult az állapotuk.

Iovan (Románia) hőnvlegyökkal 80%-nál nagyobb arányban ért el teljes gyógyulást 86 különböző nemű betegnél.

Külföldi hirdetésben propoliszos szörppel is találkozhatunk. Légzőutak bántalmaira javasolják. Ezt a formát nálunk a propolisznos méz helyettesíti.

Többféle propolisszos tabletta van már forgalomban. Általában 5%-nyi propolisszt tartalmaznak cukor, keményítő vívámyagban,

A baktériumok ellen 1,5-2 óránként lassan szopogassunk el naponta 4-5 oldatot. Az A2 vírus ellen akkor hatásos, ha belőle délelőtt, majd délután egymás után 2-3 szemet fogyasztunk el. Erre felszakad a légutakra telepedő nyálka, a légzés könnyebbé válik, a hőmelkedés megszűnik.

Propolisszos csokoládé

Tej-, vagy keserű-csokoládé 2-5% flavonoid-tartalommal. Helyileg kedvezően hat a gyomor- és nyombélfekélyre, a gyomor- és bélhurutra. Tanítsátsa a test immúnen pontján érvényesül. A hazai propoliszokban 19-21 féle flavonoid van és ezeknek legalább 40 féle gyógyhatásuk ismert. Értheti, hogy a propolisznos csokoládé egyszerre lehet élvágyserző, emésztést javító, vízletelítő, epeelvező, a cucsemő-, pajzs-, hasnyál-, mellékvese- stb. mirigyekre ható, értékű, vérnyomásszabályozó.

A propolisznos csokoládénknek nincs káros mellékhatása. A nálunk forgalmazott gyógyszerekkel nem lépnek káros interakciókba. A propolisznos készítmények fogyasztásával csökkenthetők a gyógyszerek dózisai.

Az APIKÉMIA *új termékei*

Az APIKÉMIA Kutató és Termelő GMK kutatási terveiben a propolisz lsó oldatlá hasznos hőtartósságának feltárása, termelési programjában pedig a megsikert lehetőségek gyakorlatba való átvitele szerepel. A propolisznban a vegyelemzés sokféle irányban hatott különböző bioaktív anyagot mutat ki. A kónynen bomló, a lámpafényben és általában a napfényben is meglehetős gyorsan elbomló tesz a propolisz kétségtelenül egyik legértékesebb szépségápoló anyagunk. A feladat azért nehéz, mert a propolisz hatóanyagainak a többsége hamar bekerül a vér- és nyirokkerin-

Azt, hogy a propolisz kivonat vírusellenes sajátságát milyen mértékben tartja meg,

Jalanov Zsuldan és munkatársai úgy állapították meg, hogy a kivonatot 3 hónapig 4 °C-on tárolták és különböző időkben teszkették.

A kimutatás szerint a vírusellenes hatás egy idegi nő, kb. 1 hónapig marand, de a 3. hónap végén jelentősen csökken, majd az a csökkent érték is stabilizálódik egy ideig. (A propolisz korát nem attól számítjuk, amikor a méhész kinzeli a kaptárból, hanem amikor begyűjtötték a méhek.) A nyers propolisz 2 évig lehet vesztség nélkül tárolni. Ezután az illóolajtartalom csökken, így csökken például a fájdalomcsillapító hatás is. Más alkotórészek „degenerálódnak" miatt a fertőtlenítő, vízetelítő, a fekélyt gyógyító és epehajtó, valamint vérnyomáscsökkentő hatás is kevésbé lesz hatékony.

A propolisz hatástartamának előnjeteszkor figyelembe kell venni a propolisz termőhelyét. A nyárfás területekről származó propolisz a legértékesebb. Ezután az illóolajtartalomban helyközzel vesztvég csökkent a fájdalomcsillapító hatásosságát és szeletkivesz az antibiotikus hatást. A fenyőerdők és kalkonok dagadásának tovább csökkentő a propolisz fertőtlenítő, vízetelítő, érvédő, dermatogén és epehajtó hatását. A szer-anyagok mindnak meg legtovább, vagyis a propoliszt továbbra is várhatód alsztrin-gens hatás. A mindig magmaradó fenyő-olványi anyagok miatt ilyen esetben felületgyúnni a nyers propoliszt.

A tinktúrából alakított propolisz hővös, sötét helyen változatlanság évtizedekig hatóképes marad, ám képességei a tárolással fokozatosan átrendeződnek.

A propolisz érzése a glikozidáknak angiokonzkidá alkalmával ér véget, mert kvalitív dagadásnak kezdi az egyes komponensek. Mindkét vegyületcsoport nagy bomlékonyságuk szemmelgyben előtvonnak vagy degenerálódnak, elsősorban a hatékonyság mértékre csökkennek, hatásspektrumuk szélesül kezd. A folyamat lassú és főként vízoldható vitaminok biztosításával fokozatosan fékezhető.

A magyarországi propoliszok illóolajtartalma 0,3–2,1 % között változik. Határozott összefüggés mutatkozott a mintát illóolajtartalma és az időjárási viszonyok között. Ahol a napsütéres órák száma és a 25 °C-nál melegebb napok száma magasabb és a csapadékmennyisége kevesebb, az illóolajtartalom nagyobb.

Gázkromatográfiás a következő komponensek voltak kimutathatók: fenil-vinil-éter, benzil-alkohol, gyapjkol-vinil-éter, benzilacetát, fehéjtidehid, vanilin, benzil-benzoát, P-kedimol, cildoheil-benzoát.

Az illóolajokra érzékenyek (20 mm-nél nagyobb gátlási zónát) voltak a Gram-pozitív Staphylococcus aureus SG311, Streptococcus faecalis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis és a Gram-negatív, Klebsiella pneumoniae 92011. Mérsékelten érzékenyek a Gram-negatív Escherichia coli 13001, Pseudomonas aeruginosa 17001.

A gombák közül érzékenynek mutatkoztak: Aspergillus niger, Candida albicans és a Saccharomyces cerevisiae.

A propolisznak sajátságos előnyét jól példázza a következő kimutatás, melyben az olajos anyagokat elemeztük:

Minta sorszáma	Zsíros olaj. kinyerés %	Zsírsav-tartor kinyerés %	Illóolaj vyzőr
1.	13,11	11,47	0,412
2.	18,39	13,79	0,424
3.	13,45	13,63	0,435
4.	44,00	32,00	0,27
5.	48,9	48,9	0,04
6.	38,0	34,0	0,195

Az 1–4 minta Magyarországi eredetű, az 5-ös Algériából, a 6-os Taskenből származott. A részletesebb elemzés kimutatta, hogy a magyar propoliszmintákra zsírsav-összetétele jóval összetettebb, több komponenst tartalmaz, mint a vizsgált külföldiekét.

A propolisz alkalmazása a méhcsaládban

A méhek, akárcsak a mézet és a virágport, a propoliszt is magukknak hordják, maguknak készítik. (A növényi eredetű kátrányt

A kenőcskészítés ajánlott módja: a propolisz megtisztítják, zsámáncozott edényben 45-50 °C-os vízfürdőben tartott 80 g vazelinhez 20 g propoliszt adnak, addig keverik míg homogén keveréket nyernek, ezt gézen átszűrik és ülepítik. A kenőcsöt hővös, sötét helyen tartják zsírosított dugóju üvegben.

Alkalmazási területei: a bőr allergiás és fertőző betegségei, ekcémák, élettel, ellacsötött, klóoformot használhatjuk a propolisz oldására.

Oldószer	Idő (perc)	Forráspont (°C)	Megjegyzés
Aceton	45	56	tűzveszélyes
Diklórmetán	30	40	mérgező
1,2-dimetoxi-etán	15	83	drága, mérgező
Éter	15	36	tűzveszélyes
Etilacetát	30	78	emyhén mérgező
Kloroform	30	60	mérgező
Tetrahidrofurán	15	66	kissé mérgező, drága

Ezeken kívül még 10 féle oldószer alkalmazható a propolisz oldására, de azok a felsorolottaknál hátrányban oldanak. A drága és többnyire mérgező szerves oldószereket ajánlatos visszanyerni. Erre a célra talán a Büchi Rotvapour R vagy RE készülék a legalkalmasabb. Működésének elve: az oldószer forráspontjának a propolisz összetételét nem károsító hőmérsékletre történő csökkentésével, amit a legjobb helyiségben kell elvégezni.

A kezelő propolisz-feldolgozó lapos, zsírmentes tálban vagy nagyméretű petricsészében kevés oldószerben oldjanak. A drága és többnyire mérgező oldószereket állandó szellőztetés mellett az egyébként is értelmetlen oldószer-visszanyerés mellőzésével. Az ilyen lépésre nincs szükség.

A tisztított propolisz sűrítmény kívülő balzsamok készítésére körtevésnél is alkalmas, 70%-os alkoholban oldószavaa ismert hatóanyagtartalmú propolisz-tinktúrákat állítanak elő.

Tudvalevő, hogy egyes piaci propolisz-árusok azon állítása, miszerint az ő tinktúrájuk pl. 20%-os, ezt egy liter alkoholba 20 dkg nyersgyopolisat tettek, csak akkor lehetne igaz, ha a beadagolt anyag mind feloldódna. Ez sohasem következik be, tehát ilyen alapon bizony ismeretlen marad a kivonat hatóanyagtartalma.

PROPOLISZ AZ EGÉSZSÉGÉRT

Propoliszinktúra

Propoliszból készült alkoholos fővonású kivonat. Elsősorban belsőleg használják. Nagyon alkalmas nyomai, részei és hígítási fokozatok esetén: 15-25 cseppp, kb. 1 dl citromos teában vagy limonádéban. Sajátosságai: fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkentő, baktérium-szaporodást gátló, fitoáló. Rendszeres fogyasztása az általános szervezeti ellenállóképességet magas szinten tartja. Használható belső szervek lázas megbetegedésénél, pusztulgyulladás esetén, magas vérnyomás ellen, vese- és májgyulladásnál, mandulagyulladásho, torokfájás, meghűlés esetén. A tink-túrás melegvízzel inzulációt készítsünk gargalizálásra.

Fogfájás ellen propolisz-tinktúrába mártott tampont tesznek a fájós fogra. A propoliszinktúra gátolja a rosszindulatú daganatok növekedését.

Lágy propolisz

Nyers propoliszból készült kivonat, fluvonoid sűrítmény. A koncentrátumot kézzel, zárt, légmentes edényben, egyébként könnyen felszívódó anyagokba (vazelin, lanolin, semleges zsírokból kenőcsök) keverve használható égési és egyéb (főleg gyulladásos) sebek kezelésére. Elősegíti az esetek gyógyulását, mert hatásával elősegíti a sebbely mélyülő gyógyulását.

Azalennel keverve fogbetegségekhez ellen használható. Mandulagyúlásnál keverve gyúrhatunkal használható, gyulladásos ínyeknek, retenerálódó fogkivételnél gyógyítható szerként. Külső alkalmazásakor a

kaptárban alakul át méhészeti termékké: propolisszá.) A propolisz rendkívüli jelentősége akkor ér érvényesülni legjobban, amikor a méhek még az erdőben, fasodvakban laktak. Az odvas fatörzsek bevonása megakadályozta a fa elkorhadás romlását, elhalt szövetdarabok lelhalását. Propoliszos viaszsal szűkítették, szabályozták a röpnyílást. Minden a piszok fából vagy épített műanyagból készült mesterséges kaptárakban nincs szükség, a propolisz másik szerepe viszont továbbra is érvényben van. Ez a fertőtlenítés.' A tisztaság gondjaira a méhek még ma is nagy gondot fordítanak. Ezt a tulajdonságot használják ki a propolisz gyógyászatában is. Ma a virágpor, a pempő kitűnő táptalaja lehetne a mikroorganizmusok egész hadának. A kaptár belső felületének és a benne raktározott élelmiszernek a fertőtlenítését a propolisz gyűjtésnek az a nagyszerű tulajdonsága biztosítja, hogy a propolisz minden ismert gombát, vírust, baktériumot és protozoont elpusztít.

Az APIKÉMIA Kutató és Termelő GMK évekkel ezelőtt propoliszos védőkészítményt állított elő a propolisz csúnyán kifejezett, de annál jobban ható gyógyító hatásának kihasználásával. Ez a készítmény a propolisz-oldat. Használata: a propolisz-oldatot a szájüreg és a garat-üreg, valamint a felső légutak védelmét célzó, ill. enmél mélyebben csak gőz formájában juttathatjuk el a propolisz hatóanyagait. Ezért a célra szolgáló a propoliszos inhalátum. A propolisz gőzei való, majd lecsapódó hatóanyagai a tüdő legkisebb, legfinomabb hólyagocskáiba (alveolus-alba) is eljutnak aktívvánsak különösen nélkül. A propolisz összetevői ezt a különleges feladatot azért teljesíthetik, mert a szabadalmaztatott „gőzölő hideglélátás" maximális mértékben biztosítja közömbösítésük illőolajtartalmának mikrotest a mintallyaszerű feltüzött propolisz könnyen, gyorsan belélegezhető halmazállapotba kerül.

A fluvonoidok mellett az illőolajok mutatkoznak a propolisz legfontosabb értékű hatóanyagainak. Egyikes jelentős összetevő a propolisz-terpenoidek széles fertőtlenítő spektrumát. Ezekkel szemben a kórokozónk különböző, de nem változó az érzékenysége. Olyan törzsek is előfordulnak propoliszossal, amelyek a szokásos antibiotikumokkal szemben ellenállónak.

Az inhalációt 5-10 napig naponta vagy kétnaponta kell megismételni. A második vagy a harmadik inhalációt után az alkalmazási illúlhum meglkönnyebbülnek. A propolisszos inhalátum használható gyermekek előtt tűdőgyulladásnál. Az esetek súlyosságja szerint 5-20-szori kezelésre lehet szükség. A kezelések időtartama 1, 5, 10 perc. A kezelések száma 10–15 perc helybeni pihenőt kellbeitatani. Az inhalációs segítségével fel lehet venni a kiküzdelmet a bőrghurutos szerma ellen. Várható az asztmás rohamok ritkulása esetleg teljes megszűnése.

A propolisszos és kamillán (Chamomillae flos) kívül inhalátumunk megkülönböztetett más gyógynövényeket is tartalmaz a hatékonyság érdekében. A fellegá a kekvető vagy ligetvári ízes és illatú bürcsülása érdekében. A legfontosabb kiegészítő tea-komponenseink: martilapu (Farfarae folium), tűzlőfű (Pulmonariae folium), hársvirág (Tiliae officinalis

flos), bodzavirág (Sambuci flos), somkóró (Milloti herba), papsajtlevél (Malvae folium) és pipacsszirom (Papaveris rhoeadis flos). A propolisz inhalátum hatásos és kellemes.

Propoliszos hajsampon

Időnként-időnk ész ismert a propolisz gyógyító hatása a dekalmazását erdeken kezdtetta a természetes anyagokkal. Ennek eredménye a propoliszos hajsampon megakadályozza a fejbőr vesztes fertőzések kialakulását, sőt a kórokozókat is elpusztítja. A propoliszos hajsampon szerint a celra talán a Büchi Rotvapour R vagy RE készülék a legalkalmasabb. Működésének elve: az illóolajok forráspontjának a propolisz összetételét nem károsító hőmérsékletre történő csökkentésével, amit a legjobb helyiségben kell elvégezni. A tisztaság gondjaira a méhek még ma is nagy gondot fordítanak. Ezt a tulajdonságot használják ki a propolisz gyógyászatában is. Ma a virágpor, a pempő kitűnő táptalaja lehetne a mikroorganizmusok egész hadának. A kaptár belső felületének és a benne raktározott élelmiszernek a fertőtlenítését a propolisz gyűjtésnek az a nagyszerű tulajdonsága biztosítja, hogy a propolisz minden ismert gombát, vírust, baktériumot és protozoont elpusztít. A tisztaság gondjaira a méhek még ma is nagy gondot fordítanak. Ezt a tulajdonságot használják ki a propolisz gyógyászatában is. Ma a virágpor, a pempő kitűnő táptalaja lehetne a mikroorganizmusok egész hadának. A kaptár belső felületének és a benne raktározott élelmiszernek a fertőtlenítését a propolisz gyűjtésnek az a nagyszerű tulajdonsága biztosítja, hogy a propolisz minden ismert gombát, vírust, baktériumot és protozoont elpusztít.

annyira felhígulnak, hogy az aktív anyagok mennyisége a hatáskűzsöb alá kerül. A jelenséget úgy ellensúlyozzhatjuk, hogy a propolisz hetelőleg a hatást vívó terület közvetlen közelébe visszük. Ezt azzel a vastagbőrű és a medence övtájára nehéz alkalmazni. Az alulról felvitt kenőcsök kezelése nehézkes. Arról, hogy mióge muradjon ki ez a testű a propolisz nyújtotta védelemből, a propolisz kúpok gondoskodnak.

Az APIKÉMIA Kutató és Termelő GMK évekkel ezelőtt propoliszos végbélkúpot fejlesztett ki 2 és 3 g-os csomagolásban. Használatának javallata: aranyér, dülmirigygyulladás (prostatitis), vastagbélvérzés (haemorrhágiás eredű), vastagbélkelyhek, végbélrepedés stb. A propoliszos végbélkúpot esténként, a lefekvés előtti szükséglet elvégzése után a végbélnyílás közelébe, de hal hól 30 napon át folyamatosan. A végbélkúpban a propolisz mellett a különleges hígítóanyag is közrehat a gyógyításban. A propolisszos végbélkúpot esténként, a lefekvés előtti szükséglet elvégzése után a végbélnyílás közelébe, de hal hól 30 napon át folyamatosan. A végbélkúpban a propolisz mellett a különleges hígítóanyag is közrehat a gyógyításban. A propolisszos végbélkúpot esténként, a lefekvés előtti szükséglet elvégzése után a végbélnyílás közelébe, de hal hól 30 napon át folyamatosan. A végbélkúpban a propolisz mellett a különleges hígítóanyag is közrehat a gyógyításban.

Természetesen az időt zalárt gyulladásokat, a súlyos reumatikus bántalmakat, vagy a kiterjedt bőrgombásodásokat a propolisz-szos hubfürdő mellett érdemes a sebgyógyítás más módszereivel kombinálva kezelni. A propolisszos hubfürdő rendszeres élvezete nemcsak hálás, de nem különféle egészségügyi kellemetlenségektől is megóv.

Propoliszos hintőpor

A propoliszos hintőpor a felületi megbetegedések hatékony helyettesítő a cseresznyéseknél és a szemölcsöknél. A propolisz mennyiségi tulajdonságait a kicsinyeknek először hintőpor formájában nyújthatjuk, például akkor a cucsemőli fin- és comb-redőiben bőrpirosság jelenik meg. (Már az 1 hónapos cucsemőnk is részesíthetők propoliszos hintőpor-kezelésben).

Propoliszos hubfürdő

A „megszellőített" propolisz hubfürdőben is alkalmazható a propoliszmak tulajdonított kellemetlenségek (ragacsosság, sárga) is fa-

ölbélés után másodszor is bekenjük a fejbőrt propoliszos samponnal, alupszon bedörzsöljük és néhány percig nyíja hagyjuk. A magasítselt öblítés után a haj fényes, selymes és egészséges lesz.

A propolisz fahű-származék pattanás egyeseknél a bőrfelületen és a végbélnyílásban tünetként vált ki. Rítkábban előfordulhat hasmenés is. Ezek sohasem szabad megijedtenünk. A propolisz mellett vagy éppen azzal együtt érdemes más apiterápiai anyagokat (méz, virágpor, méhpempő, stb.) is fogyasztani.

Ha gyógyszerekkel együtt kerülnek alkalmazásra propoliszos készítmények, akkor az addítív hatás kiegyenesúlyozása végett az orvosságok dózisát arányosan csökkenteni kell.

Kétjük természetesen a propolisz-készítmények túlzásokat megtiltó propolisz-fogyasztás: a napi adagot, a kúra hosszát korai, testsúlyuk és életkoruk figyelembevételével kell megállapítanunk. Ennél sohasem szabad megfeledkezni

PROPOLISZ A SZÉPSÉGÉRT

A gyógyászati funkcióktól túl a propolisz kozmetikai szerepet is betölthet.

A propolisz közismert fertőtlenítő hatása révén alkalmas a gennyesedő pattanások beszárítására. A hajszálereink tápláása a bőr jobb táplálását is előlegzi, a mirigyekre gyakorolt pufferoló hatása révén normalizálja az izzadtság- és faggyúmirigyek működését.

Peeloló és munkatársai (1977) munkája nyomán hagyatkozva a kozmetikai krémek, arcvizek, a mézfürdő, a mézsampon mind tartalmaznak propolioszt.

A propolisz szakszerű alkalmazása folytán a mechanikai és égési sérülések hegnélkül gyógyulnak, aminek ugyancsak nagy kozmetikai értéke lehet.

Az aphtások és herpeszes foltok megszüntetése ugyancsak propoliszszal megoldható szépészeti feladat.

Tágabb értelemben ide sorolható a bőrgyógyászati problémák megoldása. Pl. *Bel.kheiwe* (1976) beszámol arról, hogy a propoliszt 1957-ől alkalmaztak több mint 1500 súlyos trichophytia-, tuberculur lupus-, partial alopecia-, eksémák-, psoriasis-, hiperketosis-, stb.-ben szenvedőnél. A legtöbb esetben jó eredményt értek el.

Pilos, Elena (1980) beszámol a Romániában használatos készítmények használhatóságáról. Pl. az Acneol sadtítószgyulladás ellen, különböző arcbántalmaknál használható. Regenerálló hatású. Van propoliszartartalmú csíráltalító és szárító púderük is.

Romániában készített méhészeti kozmetikum pl. még a

Floral (propoliszos arckrém)

Alkalmazás; Fejés után a tehén tőgybimbóit, az alapi részig az emulzióba mártjuki Az ilyen módon felvitt emulzió kézzel a tőgy teljes felületén szétkeijük. Sertés tőgy-gyulladás kezelésekor naponta egyszer az emulziót gumikesztyűvel vagy tiszta kézzel a tőgybe masszírozzuk.

Tárolás: Hűvös helyen vagy szobahőmérsékleten tartandó. 30 C felett az emulzió állományа megváltozik. Sugárzó hőtől óvjuk. Hat hónapig eltartható.

A propoliszartalmú emulzió értékelése:

Igen kedvező az emulziónák a tőgy bőrére gyakorolt hatása: a tőgy bőrét rugalmassá és puhává teszi. A sérülésekre látványosan gyógyítja. Az emulzió folyamatos használat esetén kiválóan alkalmas az un. mastitisek megelőzésére.

A tőgy és a tőgybimbó bőrén a csíraszám csökkentése, a bimbónyílás, a zárószom kis sérüléseinek gyors gyógyulása a fejés után ellazult bimbó-záróizom mechanikus védelme a propolisz tartalmú emulzónak olyan tulajdonságai, amelyek a károkozók tőgybe jutásának lehetőségét csökkentik.

Szisztémás/vérútiben napi egyszeri tőgykezelés a tőgygyulladások kb. 95%-át két nap alatt meggyógyítjuk. A malacok nem kaptak hasmenést. Az emulzió bemasszírozása után a feszes, fájdalmas tőgy fellazul, a fájdalom csökken és a koca enged a malacokat szopni.

A propoliszartartalmú emulzió hiányától a koca mastitis gyors kezelésében. -

PROVET sebspray

Propoliszartartalmú alkoholos oldat állatok sebkezelésére

Indikáció: Felületi sérülések, felsőbőr, fertőzött sebek, gyulladások kezelésére.

Alkalmazása: Ecseteléssel, vagy spray formában a beteg testfelületet egyenletesen fedjük naponta 1-2 alkalommal.

Tárolás: Fénytől védve, sötét üvegben tárolandó. Szobahőmérsékleten 1 évig eltartható. Sugárzó hőhatástól védjük.

PROPOLISZOS KÉSZÍTMÉNYEK A SAJÁT GYAKORLATOMBAN

Minden cigány a maga lovát dicséri. Ha azt kérdezik sportolótól, hogy milyen eredményeket értek el, akkor, kiderül, hogy mindagyik bajnok (volt valamikor). Ha írókat, színészeket, művészeket kérdezünk meg teljesítményükről, akkor mindenki zseni (többnyire meg-nem-értett). A vadászok, a halászok és a gyógyászok is - egy idő múlva - csak a siker emlékeznek. Érthető emberi magatartás, de tehetünk a valódi sikerekért nem is keveset.

A következő néhány konkrét, megtörtént és levélbel is bizonyított eset szolgáljon tevékenységem minősítésére. A példák propoliszos készítményekre (csepp, spray, balzsamok, propoliszos cukorka és propoliszos csokoládé) vonatkoznak.

A propoliszos készítmények használatát hefolyásoja a túlérzékenység és az *idés*. Ezeket a szubjektív tényezőket is figyelembe kell venni. Íme néhány vélemény.

P. L.-né (Pécs, március 31.) A csokoládé nagyon finom, én egyébként is imádom a mézet meg egyáltalán a méheket.. A csokoládéról ismét - nagyon kellemes közérzetet biztosít, úgy veszem észre, hogy élénkít is, fáradság ellen is nagyon jó, a másik hatása amit figyeltem, hogy nagyon jól tűri az ember az ébrséget mellette, nem fáj a gyomra így alkalmas fogműlárászra, mereném is ajánlani bárkinek.."

T. I. (Baja, december 31.) „Propolisz küldeményedből a mokkás cukrorat a rokonság, ismerősök körében többen fogyasztották. Én is étem pár hétig. Közérzetben jót tett, normális vérnyomásom azonban alacsony lett." „A csokoládétat mintánuk kértem, 3 félét

„Kezdem azzal - *B. I. (Szigetvár, május 28.)* -, hogy a 4%-os kúra nagyon bevált. Megszűnt a puffadás, a hasmenés, és az epének is fájdalma, annak kellemetlen kihatása. A kenőcsöel sajnos ilyen szerencsém nincsen, ugyanis nem csillapította, vagyis abba kellett hagynom, mert olyan kellemetlen érzést keltett, mintha viszkednék.

És sajnos azt is meg kell írnom, hogy olyan állapotban kaptam meg a csomagot, hogy a postán rá is írták, hogy felbontva érkezett.."

H. Dezsőné (...5) „Hálával tartozom önnek a küldött gyógyszerért. Nagyszerűen bevált és a seb szépen gyógyul. Sajnos még nem teljesen gyógyult be, de az is nagyszerű érzés, hogy nem fáj. Pedig az ón által küldött propolisz-balzsam használata előtt nagyon fájt is a seb. Általában fájdalomcsillapítót szedtem."

K. Éva (Siklós) „Örömmel közlöm, hogy a sebem lassan javulni kezdett. Már kevesebb a váladék, a seb szép tiszta és kezd kisebbedni. Ma elfogyott a balzsam, ha lehet, kérem, hogy küldjön még egy adagot. Az írást is kérem, hogy írja meg."

P. S.-né (Martfű, december) „Én P... Sándorné Martfűről akinek tetszett a fekélyes lábamra küldeni propolisos cseppet és balzsamot, nagyon jól és szépen feltisztult.."

Sz. L. (Zalaegerszeg, november 18.) „...Feleségem nyombélfekély betegségére ezen propolisos csokoládét akarta kipróbálni - ami azóta meg is történt. Mi a 3%-os készítményt választottuk és az első

Leírás: A „Floral" arckrém lágy-propoliszból, lanolinból, méhviaszból, cetáceumból, stb. áll. A krém színe sárgás-zöld. Ez az újszakai krém szabályozza az élettanilag fontos folyamatokat és a bőrnek ídő, bánosonyos felsőint kölcsönöz.

Javaslat: Hálá az illőolajokban gazdag propoliszunk és egyéb anyagoknak az a preparátum rendkívüli antiszeptikus és fertőtlenítő (dezinficiáló) képességgel rendelkezik. A krém enyhítheti nyújt a kiszáradt repedezett bőrnek.

Használat: A „Floral" propoliszos arckrémet kis mennyiségben visszük fel az arcbőrre és újjunk hegyével egyenletesen elmasszírozzuk. Ezt megtehetjük este lefekvés előtt, vagy reggel, mintha púdereznénk. A krémet csak előzőleg letisztított arcbőrre használjuk. Tisztításhoz ajánljuk a „Floramin" arctejet, vagy a „Tenapin" arcvizet. A szappan kerülendő.

Csomagolás: 35 g-os tubus. Ha már itt tartunk, ismerkedjünk meg az ajánlott készítményekkel is.

Floramin (mézes arckrém)

Leírás: Puhító éjszakai krém.

Tartalma: Méhviasz és méz, cetáceum, sztearin és más, kozmetikában használatos anyagok. A mézt gazdag fermentum, cukor, vitamin, ásványi anyag., stb. tartalmával táplálja a bőrt és üde, rugalmas megjelenésű kölcsönöz annak.

Javaslat: A szárazz, a normál és a zsíros bőr ápolására is javasolható. Regenerálja a bőrt, kisimítja a ráncokat.

Használat: A krémet előtesztesen jól megtisztított bőrre (például kamillatea használata után) kell felvimi és módszeresen bemasszírozni. Ajánlható közvetlen éjszakai krémnek, vagy mint nappali pudernlapozó is alkalmazható.

A „Floramin" arckrém különösen alkalmas értékeny bőr ápolására.

Csomagolás: 25 g-os doboz.

Tenapin (újszakai arcvíz)

Leírás: A „Tenapin" arctisztítószer méhpempőt, vírágport tartalmaz, ezekkel együtt sokféle vitamint, hormont, enzímet és speciális

A propoliszartartalmú alkoholos oldat: antibiotikumot és szulfonamidot nem tartalmaz, viszont agensei olyan bioaktív anyagok, amelyek ellen a mikroorganizmusok nem, vagy alig is rezisztenciát. Az antibakteriális hatás mellett fájdalomcsillapító képessége isjelentős. (1987-ben készített termékek.)

PROVET kenőcs

Propoliszartartalmú kenőcsjuhok bőrbántalmainak kezelésére, fekélyek, fertőzött, gyulladásos sebek kezelésére. Sebgyógyító, szárító hatású.

Alkalmazása: A beteg testfelületet naponta egyszer egyenletesen kenjük be.

Tárolás: Tubusban, szobahőmérsékleten vagy hűvös helyen 1 évig eltartható.

Akénőcs értékelése: A csülökszaru furagása után a kenőcsös kezelés a bőrbántalmakban, az ún. panaritium felületi formáit 2-3 nap alatt, súlyosabb eseteit a második kúra után teljes értékűen gyógyítja. A kezelt láb fédése nem szükséges. A kenőcs jól tapad a beteg testfelületen. Hatásos sebgyógyító és fájdalomcsillapító. A kenőcs hazai alapanyagból készült, ezért a kedvező gyógyhatáson túl jelentős importmegtakarítást is biztosíthat.

Az állatorvosok külföldiőn is használhatnák propoliszos készítményeket.

A propolisz alapanyagát képező balzsam eredeti feladata a növény védelme. Tapasztalati tény, hogy a nyárfa és a nyírfa fiatal hajtásait, amíg balzsam borítja felületüket, semmiféle kórokozó nem támadja meg. (A balzsam a levegőben és a napfényen hamar degradálódik, lebomlik.) Ebből a megfigyelésből kiindulva ma már több helyen használjuk a propoliszt a növényvédelemben, sőt a növénytermelés-, ben is. Ezzel párhuzamosan egy- és többszörös növények kísérleti alanyként gyakran szerepelnek az alapkutatásokban.

A propoliszunk növényvédelemben való felhasználása nem egészen újkelető. Először az olasz *Prehevi* alkalmazta sikeresen egyes növény- és rovar-ellenes propoliszos készítményeit gyümölcsösben, bur- gonyán és babon.

A német Bogislaw Tesmar von Bonin 1984 nyarán Schlatz-Holstein-ban burgonyavész-vész (Phytophtora infestans) ellen eredményesen alkalmazta propoliszból és lecitinből készített preparátumát.

Csoh kutatók *Bajnansky és Kosljarova 25%-os etanolban 10% propoliszjelenlét próbálták ki növényi vírusokra. Ezek a következők voltak: uborka mozaikbetegségének vírusa, a dohányfolsosodas vírusa.*

Tapasztalataik: a legkisebb érzékenység az uborka mozaikbetegsége vírusánnál jelentkezett, még a legnagyobb a dohányexhalta vírusánál mutatkozott.

A leghatékonyabb védekezési eljárás az volt, amikor a növényi felületre először előkezt a propoliszt vitték fel, a utután a vírus-szuszpenziót. Ebben az esetben a levelek fertőződtsége 62-85%-kal csökkent.

Idő előtt a fertőzőképesség is csökkent, a vírus-szuszpenzió hígításával egyenesen arányban nőtt a propolisz hatása.

Ezek a kísérletek azt bizonyítják, hogy a propolisz a növényi szervezetben is képes a védekező folyamatokat elindítani, illetve fokozni.

Ezek a kísérletek azt bizonyítják, hogy a propolisz a növényi szervezetben is képes a védekező folyamatokat elindítani, illetve fokozni.

„A propoliszkivonat addíciós előnnyel kevethető antibiotikumokkal és szalicilsav preperátumokkal. Ezt a lehetőséget ki is lehetne próbálni a lábszárfekély esetében." (1984. március 12.)

„Kenőcsünkkel az eddigi tapasztalatok szerint lehet ekcémát gyógyítani. A propolisz különösen az ún. nyílt ekcémákkal szemben mutatkozott hatásosnak. Azt is volt szerencsénk tapasztalni, hogy a bőrgyógyász általjavasolt receptre elkészített kenőcs önmagában hatástalan maradt, propoliszsal dúsítva igenjó eredményt adott." (1984., március2.)

„A propoliszos cukorka mellett ajánlatos kevesebb gyógyszert fogyasztani. Nem az ellenhatás következtében, ha nem ellenkezőleg - a hatások összegződése miatt. Fogyasszon naponta 4-5 cukorkát és a szokásosnál 2/3-dal kevesebb gyógyszert. Ha márjól érzi magát, akkor előbb a gyógyszerfogyasztást függessze fél, egyúttal a cukorkaadagot is szállítsa le napi 2 darabra." (1985.)

„Levele gondolkodóba ejtett. Amit kér, az nekünk rendelkezésünkre áll, ám nem tudjuk, hogy mire kell, ezért most csak mintányi- mennyiséget tudunk, hogy ne mellőlőzve ezeket a készítményeket. Egyeztünk meg abban, hogy ha valamelyik valamire jó volt, abból majd még kér, mielőtt egészen elfogyna a készlete.

Nem nagyunk benne bíztouk, hogy ismert a csokorka és csokoládé felhasználási módjait, céljait. Ezét pár szóval ecsetelem. A propolinzos cukorka elsősorban a szájgaratüreg és a felső légutak gyulladásos-, sérüléses bántalmai ellen készült. Mellékesen szívműködésre is kedvezően hat. Naponta 4-5 szem aztálagos adag. A csokorkák fogyasztása közben legalább annyi időt teljék el, hogy az előző szemet követő csípős érzés teljesen elmúljék.

Túlfogyasztás esetén a szem és a szá körül kipirosodás, viszketés jelentkezik. Ekkor néhány (3-4) napra abba kell hagyni a propoliszfogyasztást.

A propolizált csokoládé gyomor- és nyombélfekélyre, gyomor- és bélhurut ellen jó elsőorban. Távhatásként mindennemű gyulladást gátol a szervezetben. Tágítja az ereutat, szabályozza a gyomor-savtermelést, megszűntet bizonyos fejfájásokat, fokozza hajszálereink ellenálóképességét. Általában csökkenti a vérnyomást. Túlfogyasztás esetén nem javasolható a propolizált pattanások kezelésétnethez a test bármelyik részén." (1984. április 9.)

Olykor a beteg majdnem egészen konkréta ne kér valamit, de azt csak sejteni lehet, hogy milyen tömegre volna szüksége.

„Levelében közölte, hogy mennyit és milyen hatású anyagokból álló propoliszos kenőcsöt kér, de azt nem, hogy az milyen tömegnél lággyen. Az előzményeik ismeretében most 15%-os krémet készítettem. Ez a arányla nem erős. Fokozni a propolisz hatást egyrészt a tömegség növelásével, másrészt a beteg felület gyakoribb kezelésével lehetséges. A propolisz hatóanyagai (flavonoidok, kalkonok, illóolajok) egyébként is könnyen elterjednek a szervezetben, a vér és mirok-keringés sztószaija az egy helyre került anyagokat. A gyakoribb bekenés, tehát mindenképpen indokolt lehet. Ezt az eljárást követő szárító hatást hidratáló krémmel ajánlatos ellensúlyozni. A helyes használatot, az egyemúly megteremtését

PROPOLISZ AZ ÁLLATOKÉRT

A humán gyógyászatul egyidőben állatokat is gyógyítottak propoliszszal, egyúttal állatokon próbálták ki újabb eljárásokat, nyújtuk kísérletezték ki az új eljárások sztlesződő alkalmazási lehetőségeit. Többféle kísérleti állat szerepelt a propoliszszal kapcsolatos kutatásban.

A propolisz-kivonatok fájdalomcsillapító hatása közismert. A népi gyógyászat évszázadok óta támszkodik a propolisz ezen hatására. A propolisz fájdalomcsillapító tulajdonságát tudományos alapossággal vizsgálták *Artur Snyko* és munkatársai 1985-ben.

PROVET tőgyinfúzió

Indikáció: PS2 - az azonnal felismert enyhe.akut mastitis-ek kezelésére, illetve megelőzésére.

PS6 - heveny és súlót kevert fertőzésű mastitis-ek minden formájára.

Alkalmazása: A PROVET tőgyinfúzió a tej csatornába, ill. a tejmedencébe juttatják a tőgykatéterben vézdőző speciális fecskendő segítségével.

Tárolás: Az alkalmazott anyagok ismeretében a hatékonyságot 2 évre biztosíthotnak véljük. A hőmérséklet ingadozásait e készítmények tág határok közóit is jól tolerálják.

A propolisz kiváltotta törpenövés nanizmus közvetlenül hasznosítható a borjúnak növények kialakításában, viszont a növénypéldenben kétféle lehetősége van e nemkívánt hatás elkerülésének: -

1. A hígítás fokozása,
2. Növényi hormonos (auxinos) kompenzálás.

A nagyközönség előtt 1987. február 24-27-én Budapesten a „Tavasz a télben" c. kiállításon mutattuk be a propolisz alkalmazhatóságát a növényvédelemben, növénytermelésben.

Szilai Zsázsl az AKI Méhtenyészeti Osztály tudományos munkatársával hucemumagvakkal és napraforgó-kaszatokkal olyan sorozatot készítettünk, ahol különböző hígítású oldatokkal serkentettük, illetve emelkedő tömegséggel fokoztuuan gátoltuk a mag csírázását, majd pedig szabályoztuk a csíranövény növekedését.

Burgonyánál a gumócsírázás lassításának fokozatait kísérült előállítanom a teljes gátlásig bezárólag.

Dr. Tóthné dr. Zahorecz Erzsébet a GATE Növényvédelmi Tanszékének adjunktusa ugyanekkor petricsészében, táptalajon, csiktechnikával két növényi kórokozó gombafajon (Fusarium oxysporum, Septoria lycopersici) ugyancsak sorozathígítással démonstrálta a propolisz hatóanyagainakgombaölő voltát.

Az akkor még prospe rálló Apiklemia, GMK propoliszos „fa-spray" készítménye a fikon okozott sebek lezárására és fertőtlenítésére a gyakorlatban is bevált.

ZÁRSZÓ

Egerelőre ennyit kívántam közölni-az apiterápiáról.

Lehetne írnijóval többet is, de talán ez is elég arra, hogy felhívja a figyelmet egy ősi gyógyítási formára és annak legújabb lehetőségeire.

Az apiterápia nem mindenhatót - ahogy a többi gyógyítási szem az - de bővíti a lehetőségek körét, tökéletesíti a többi terapeutikus beavatkozást, sőt az is lehet, hogy az egyéb eljárások közöttí hézagokat kitölti, áthidalja a hiányosságokat.

Az apiterápiát alkalmazók egyetértenek minden gyógymódot megismerni, a természetgyógyászatiakat és a hivatalosakat egyaránt. Jó lenne, hal ugyanezaz érdeklődés vázont is megjelenne. Mindannyian használ láttnánk - a gyógyítani és a gyógyulni vágyók egyaránt. Ezt a célt kívánja szolgálni ez a mű, ami kedvet csinál az apiterápiához, bizalmat szeretne kelteni hozzá és bizonyítja annak reális értékét.

Ez a könyv nem teljes, mert nem tartalmaz mindent, amit már tudunk, és nem lehet teljes azért sem, mert is ismeretanyagunk nem lezárt, nem végleges.

A többit majd az élet írja meg, a jövő.

Budapest, 1991. október 6.

Dr. Szalay László

Dr. T. L. (Pécs, december 20.) „Állapotomban annyi változás van, hogy a napokbanjelentkező enyhe, gyanús jelek után (...) használtam a 4%-os készítményt.... 10 hónapos tünet és panaszmentesség után úgy vélem, hogy nekem a preventive 6-8 hónaponkénti kellene megismételni e kúrát. Korábbi állapotomhoz képest a propolisszos készítménynek hatásosnak bizonyult. Ezért kérem, küldjél újabb lelzsírmenyt, hogy legyen tartalékom."

A kórtünetek enyhítése, vagy megszüntetése nagy hatással van a hangulatra.

K. M.-né (Dobrecen, november 10.) „Aztán megpróbáltam a cukorkát. 3 napon át napi 5 szem cukorkát szopogattam el, majd 2 napot kihagytam és újabb 2 napot át a még meglévő 5-5 db cukorkát.

Szinte napról-napra érezem ezen idő alatt a javulást. Teljesen nem mulasztotta el az arcúrúg-gyulladást, de már lényegesen kevesebb flegma jött le az öregcsőből. Vártam ah. 2 hetet, a két hét, ehelyett ismét éreztem, hogy csupa hurutos az arc- és ormmelők stb. üreg. Akkor elkezdtem a propolisszos csokit reggel és este amíg el nem fogyott. De csak 2/6-ost ettem meg. Ez újra segített, szinte teljesen elmúlt a gyulladás. A kúrák alatt a közérzetem is sokkal jobb volt. Nem voltam fáradékony, tele voltam ambícióval. Aztán azóta, ha jól számolok kb. 1 hónap telt el. Most már újra érzek hurutot, kissi fejcsó hurutot is. De ez úgy érzem ne m olyan nagy mértékű amiljen volt. A 3%-os csoki még meg van, de mugamtól nem mereik hozzányúlni."

A természetes anyagokat alkalmazó gyógyászatnak szembe kell nézni saját természetéből eredő veszélyeivel, kudarcaival.

A természetes anyagok hatása hosszabb, rendszeresebb használat után jelentkezik. Az ehhez szükséges türelem, a kitartás olykor hiányzik a beteg emberekné.

A propolisz alkalmazása esetében gyakran tapasztalható az aggodalomból fakadó „altal-fogyasztás", vagyis a hatáskúszób alatti adagok alkalmazása - ami természetesen csalódáshoz vezet.

A bizalmatlanság miatt a páciens az általunk javasolt paramedikumon kívül különböző gyógyszereket is fogyaszt, amivel ismeretlen mértékű additív, szinergista, vagy éppen antagonista hatást vált ki.

A teljes bizalom, viszont oda vezethet, hogy „önállóan" arra is használjáik készítményeinket, amre nem javasoljuk, ez rossz, mert tudjuk, hogy különböző dolgokra különböző anyagok hatnak és jó szerek, vagy eljárások egyes esetekben ellenjavallak.

Mégis minden hibalehetőség és veszély ellenére vállaljuk a gyógyítást, ami többnyire sikeres, ami általában elismerést vált ki és jóérzéssel tölt el bennünket, például, ha ilyen levelet kapunk:

R. E. (Lányesők, október 5.) „Részemről annyit tudok írni, hogy a készítmény jó és szeretném ha többen megismernék."